ЛП-№(011100)-(РГ-RU) от 25.07.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.07.2025 № 18089
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФИТОЧИСТИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ФИТОЧИСТИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: Сенны листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активный компонент

Сенны экстракт сухой с содержанием суммы агликонов антраценового ряда в пересчете на хризофановую кислоту и сухое вещество 1,35 %	– 0,300 г

Вспомогательные вещества

Сахар молочный (лактозы моногидрат)	– 0,024 г
Крахмал картофельный	– 0,064 г
Кальция стеарат	– 0,012 г

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от коричневато-серого до коричневого с зеленоватым оттенком цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения запоров; контактные слабительные средства.

Код АТХ

A06AB06.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает слабительное действие, наступающее через 8-12 ч. Слабительный эффект обусловлен содержанием антрагликозидов, воздействующих на рецепторы толстого

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.07.2025 № 18089
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

кишечника и усиливающих его перистальтику, что приводит к более быстрому опорожнению кишечника.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Хронический запор, вызванный гипотонией и вялой перистальтикой толстого кишечника; регулирование стула при геморрое, проктите, трещинах анального отверстия.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, спастический запор, спастический колит, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, аппендицит, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, прободная язва, проктит и геморрой (фаза обострения), «боль в животе» неустановленного генеза, метроррагия, желудочно-кишечное кровотечение, цистит, нарушение водно-электролитного обмена, беременность, период грудного вскармливания, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за наличия лактозы), детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой или по 1-2 таблетки на ночь и утром натощак. Курс лечения – от 1-4 дней до 1-1,5 мес.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, коликообразные боли в животе, метеоризм. При длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны колит, потеря с калом электролитов, в основном калия, альбуминурия, гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, тошнота, рвота, диарея, обесцвечивание мочи, кожная сыпь.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.07.2025 № 18089
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Диарея, тошнота, рвота, нарушение водно-электролитного обмена, обесцвечивание мочи, кожная сыпь, судороги, сосудистый коллапс, спутанность сознания.

Лечение

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При длительном применении в высоких дозах возможно усиление побочных эффектов сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии.

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, глюкокортикоидами и препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.

Нарушает абсорбцию антибиотиков тетрациклинового ряда.

Особые указания

При длительном применении препаратов сенны может развиваться привыкание, в связи с чем прием препарата ФИТОЧИСТИН целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,088 г углеводов (0,007 ХЕ).

Препарат ФИТОЧИСТИН содержит лактозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы лопарей или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

Если при применении препарата в течение 3-х дней дефекация не происходит, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.07.2025 № 18089
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Таблетки, 300 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14

Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru