ЛП-№(013743)-(РГ-RU) от 02.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.02.2026 № 3073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Протаргол

Регистрационный номер:
Торговое наименование Протаргол
Международное непатентованное или группировочное наименование Серебра протеинат
Лекарственная форма раствор для местного применения
Состав
Действующее вещество:
Серебра протеинат – 0,20 г (в пересчете на сухой Протаргол)
вспомогательное вещество:
Вода очищенная - до 10 мл
Описание Темно-коричневая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.
Код АТХ: R01AX10
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Препарат серебра (серебра протеинат содержит 7,5-8,5 % серебра). Оказывает вяжущее, антисептическое и противовоспалительное действие. Диссоциирует с образованием ионов серебра, которые связываются с ДНК бактерий и препятствуют их размножению на слизистых оболочках в условиях местного применения. Механизм действия серебра протеината основан на том, что ионы серебра на поврежденной слизистой оболочке осаждают белки и образуют защитную пленку, которая способствует уменьшению чувствительности нервных окончаний и сужению кровеносных сосудов (это приводит к уменьшению отека), что в свою очередь обуславливает торможение воспалительных реакций. Ионы серебра также подавляют размножение различных бактерий. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *B. cereus, C. albicans, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus,A. niger, S. Abony* и др.
Фармакокинетика
При местном применении практически не адсорбируется.
Показания к применению
Препарат Протаргол показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 до 18 лет для симптоматической терапии острого назофарингита, синусита, острого ринита (насморка).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к серебра протеинату или любому другому компоненту препарата, беременность, период грудного вскармливания, атрофический ринит. Детский возраст до 3-х лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.
Способ применения и дозы
Местно.
Перед применением препарата рекомендуется промыть и очистить носовые ходы.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.02.2026 № 3073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Взрослым и детям старше 6 лет: по 2-3 капли или 2 орошения из флакона с насадкой-распылителем в каждый носовой ход 3 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.
Детям в возрасте от 3 до 6 лет: по 1-2 капли или 1 орошение из флакона с насадкой-распылителем в каждый носовой ход 3 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.
Действие препарата проявляется через 2-3 дня.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

При применении препарата возможны следующие нежелательные явления: аллергические реакции (кожный зуд, крапивница), ощущение жжения, раздражения и онемения слизистой носа, сухость во рту, покраснение глаз, атопический дерматит, отек Квинке, анафилактический шок. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При рекомендуемом способе применения передозировка маловероятна.
Симптомы
Возможно усиление побочных эффектов. При случайном проглатывании большого количества препарата может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Лечение
При сильном раздражении, жжении, зуде, слизистые оболочки промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Фармакодинамическое, фармакокинетическое взаимодействие: не изучено. Фармацевтическое взаимодействие: соли цинка, меди, свинца, серебра, ртути, железа, алюминия образуют с раствором препарата нерастворимые осадки; раствор препарата инактивируется солями алкалоидов и органическими основаниями (эпинефрин).
Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Возможно окрашивание отделяемого из носа в серый или синий цвет. Не следует превышать рекомендованные дозы, особенно у детей и пожилых людей.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для местного применения 2%.
По 10, 15 и 100 мл во флаконы-капельницы или флаконы полимерные полиэтиленовые матовые или белые с пробкой-капельницей, насадкой-распылителем или дозатором и крышкой, навинчиваемой с контролем вскрытия.
Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.02.2026 № 3073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности.
Использовать в течение 10 суток после вскрытия.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии
ООО НПК «ФармХимКомплект», Россия, г. Москва, ул. Молодцова д.27, к.2, кв.119, т ел: (499) 641-10-07, 8-926-748-59-85
Производитель
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, д.2, тел. (4822) 44-47-26, 44-41-19