МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N003379/01- 210414
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

«Торин®»
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг и 100 мг
ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "__" 210414 20____ г.

Старая редакция			**Новая редакция**		
Состав: каждая покрытая оболочкой таблетка содержит			**Состав на одну таблетку**		
Наименование	Количество, мг		Наименование	Количество, мг	
	Таб. 50мг	**Таб. 100 мг**		**Таб. 50мг**	**Таб. 100 мг**
Сертралин гидрохлорид	56	112	*Активное вещество:*		
в пересчете на сертралин	50	100	Сертралина гидрохлорид	56	112
Вспомогательные вещества			в пересчете на сертралин	50	100
Кальция фосфат дигидрат	77,6	155,2	*Вспомогательные вещества (ядро):*		
Натрий карбоксиметилкрахмал (примогель)	4,8	9,6	[Кальция фосфат дигидрат	77,6	155,2
Целлюлоза микрокристаллическая	11,2	22,4	Натрий карбоксиметилкрахмал (примогель)	4,8	9,6
Кремния диоксид коллоидный (аэросил)	0,8	1,6	Целлюлоза микрокристаллическая	11,2	22,4
Повидон (поливинилпирролидон)	8	16	Кремния диоксид коллоидный (аэросил)	0,8	1,6
Кальция стеарат	1,6	3,2	Повидон (поливинилпирролидон)	8	16
Оболочка			Кальция стеарат]	1,6	3,2
Гипромеллоза (гидроксипропилметил-целлюлоза)	2,15	4,3	*Масса таблетки без оболочки*	160	320
Повидон (поливинилпирролидон)	1,35	2,7	*Вспомогательные вещества (пленочная оболочка):*		
Макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000)	0,45	0,9	[Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)	2,15	4,3
			Повидон (поливинилпирролидон)	1,35	2,7

84018

Старая редакция			Новая редакция		
Титана диоксид	0,45	0,9	Макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000)	0,45	0,9
Тальк	0,6	1,2	Титана диоксид	0,45	0,9
			Тальк]	0,6	1,2
			Масса таблетки с оболочкой	165	330
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг и 100 мг. По 7 таблеток (для дозировки 50 мг) или по 10 таблеток (для дозировки 100 мг) в контурную ячейковую упаковку. По 28 таблеток (для дозировки 50 мг) или по 30 таблеток (для дозировки 100 мг) в банку из полимерных материалов. Каждую банку или 2, или 4 контурные ячейковые упаковки по 7 таблеток (для дозировки 50 мг) или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток (для дозировки 100 мг) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.			**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг и 100 мг. По 7 таблеток (для дозировки 50 мг) или по 10 таблеток (для дозировки 100 мг) в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 28 таблеток (для дозировки 50 мг) или по 30 таблеток (для дозировки 100 мг) в банку из полимерных материалов с винтовой горловиной и крышкой навинчиваемой из полипропилена и полиэтилена низкого давления. 1 банку или 2, или 4 контурные ячейковые упаковки по 7 таблеток (для дозировки 50 мг) или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток (для дозировки 100 мг) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.		
Срок годности: 2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.			**Срок годности:** 4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.		

Начальник Медицинского управления Г.А. Кузнецова

"ВЕРОФАРМ" "VEROPHARM" ОАО Дирекция по развитию

МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 НЦЭСМП

84018