МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003518-140819
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ДИНАМИКО ФОРВАРД
наименование лекарственного препарата

пленки, диспергируемые в полости рта, 50 мг, 100 мг
лекарственная форма, дозировка

СТСБИО Инк., Республика Корея
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 140819 201__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 пленка содержит: *активное вещество* силденафил 50,00/100,00 мг; *вспомогательные вещества:* пуллулан 31,24/62,48 мг, пропиленгликоля алгинат 2,20/4,40 мг, камедь ксантановая 0,20/0,40 мг, глицерол 13,00/26,00 мг, натрия хлорид 0,30/0,60 мг, симетикон эмульсия (30%) (в пересчете на сухое вещество) 0,50 (0,15)/1,00 (0,30) мг, полисорбат-80 0,90/1,80 мг, мяты перечной листьев масло[1] 0,20/0,40 мг, Kollicoat® IR Brilliant Blue 0,29/0,58 мг (макрогола и поливинилового спирта сополимер 58,1%, коповидон 6,4%, титана диоксид 8,4%, каолин 15,3%, натрия лаурилсульфат 1,9%, краситель бриллиантовый голубой 9,9%), Kollicoat® IR Carmine 0,41/0,82 мг (макрогола и поливинилового спирта сополимер 58,1%, коповидон 6,4%, титана диоксид 8,4%,	**Состав** 1 пленка содержит: *действующее вещество* силденафил 50,0000/100,0000 мг; *вспомогательные вещества:* пуллулан 31,2400/62,4800 мг, пропиленгликоля алгинат 2,2000/4,4000 мг, камедь ксантановая 0,2000/0,4000 мг, глицерол 13,0000/26,0000 мг, натрия хлорид 0,3000/0,6000 мг, симетикон эмульсия (30%) (в пересчете на сухое вещество) 0,5000 (0,15)/1,0000 (0,30) мг, полисорбат-80 0,9000/1,8000 мг, мяты перечной листьев масло[1] 0,20/0,40 мг, краситель FD&C синий №1 0,0144/0,0288 мг, краситель FD&C красный №40 0,0100/0,0200 мг, натрия сахаринат 0,2000/0,4000 мг, сукралоза 0,2000/0,4000 мг, вода[1] 0,235/0,470 мл. [1] - удаляется в процессе производства готового продукта.

Старая редакция	Новая редакция
каолин 15,3%, натрия лаурилсульфат 1,9%, краситель кармин красный 9,9%), натрия сахаринат 0,20/0,40 мг, сукралоза 0,20/0,40 мг, вода[1] 0,235/0,470 мл. [1] - удаляется в процессе производства готового продукта.	
Форма выпуска Пленки, диспергируемые в полости рта, 50 мг, 100 мг. По 1 пленке в ПЭТ/ПЭ/Al/ПЭ/ЛПЭНП саше. По 1, 2, 4 или 6 саше вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	**Форма выпуска** Пленки, диспергируемые в полости рта, 50 мг, 100 мг. По 1 пленке в ПЭТ/ПЭ/Al/ПЭ/ЛПЭНП саше. По 1, 2, 4 или 6 саше вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с контролем первого вскрытия.
Условия хранения Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!	**Условия хранения** Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.	**Срок годности** 4 года. Не применять по истечении срока годности.

Менеджер по регистрации

Задерей А.В.