ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СИЛИБИНИН

Регистрационный номер
Торговое название препарата: Силибинин
Международное непатентованное название: Силибинин
Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активного компонента	
Силибинина экстракта сухого (Расторопши пятнистой плодов экстракт) с содержанием суммы флаволигнанов в пересчете на силибин и абсолютно сухое вещество 65,0 %	– 0,1 г
Вспомогательных веществ [сахар молочный (лактоза), крахмал картофельный, магния стеарат]	– достаточное количество до получения таблетки массой 0,2 г

Описание
Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской от светло-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа
Гепатопротекторное средство растительного происхождения.

Код АТХ
[A05BA03].

Фармакологические свойства
Обладает гепатопротективным и антитоксическим действием. Лечебный эффект обусловлен воздействием на метаболизм гепатоцитов. Активирует синтез белков и ферментов в гепатоцитах, оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану гепатоцитов, тормозит проникновение токсинов в клетки печени, ингибирует дистрофические и потенцирует регенеративные процессы в печени.

Показания к применению
Токсические повреждения печени, хронический гепатит, цирроз печени (в составе комплексной терапии), состояния после перенесенного гепатита. Профилактически применяют при хронических интоксикациях (в т. ч. профессиональных), длительном приеме лекарств и алкоголя.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не рекомендуется применять детям до 12 лет.

Беременность и лактация
Не рекомендуется применять в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы
Внутрь. Детям старше 12 лет и взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в сутки за 30 минут до еды. Курс лечения – 25-30 дней. При необходимости курс повторяют через 1-3 месяца.

Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях послабляющее действие.

Передозировка
Возможно усиление побочных эффектов.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучено.

Особые указания
Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций, не изучено.

Форма выпуска
Таблетки 100 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии
ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.
Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90

И.о. директора ИДКЭЛС
ФГУ «НЦ ЭСМП» А.Н. Васильев

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ» С.А. Постельников