МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-011797- 050213
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Симвор®

наименование лекарственного препарата

таблетки покрытые оболочкой 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг

лекарственная форма, дозировка

Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 05 02 13 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие *Пищеварительная система*: возможны боли в животе, запор, метеоризм, тошнота, диарея, панкреатит, рвота, гепатит, повышение активности «печеночных» ферментов, щелочной фосфатазы и креатинфосфокиназы (КФК). *Нервная система и органы чувств:* астенический синдром, головная боль, головокружение, бессонница, мышечные судороги, парестезии, периферическая нейропатия, расплывчатость зрения, нарушение вкусовых ощущений, потеря памяти, спутанность сознания. *Аллергические и иммунопатологические реакции:* ангионевротический отек, ревматическая полимиалгия, васкулит, тромбоцитопения, увеличение СОЭ, лихорадка, артрит, крапивница, фотосенсибилизация, гиперемия кожи, приливы, одышка,	**Побочное действие** *Со стороны пищеварительной системы:* боли в животе, запор, метеоризм, тошнота, диарея, острый панкреатит, рвота, гепатит, повышение «печеночных» трансаминаз, щелочной фосфатазы и креатинфосфокиназы (КФК), холестатическая желтуха, фатальная и нефатальная печеночная недостаточность. *Со стороны нервной системы и органов чувств:* астенический синдром, головная боль, головокружение, бессонница, мышечные судороги, парестезии, периферическая нейропатия, нечеткость зрительного восприятия, нарушение вкусовых ощущений, потеря памяти, спутанность сознания, депрессия. *Аллергические и иммунопатологические реакции:* ангионевротический отек, ревматическая полимиалгия, васкулит, тромбоцитопения, увеличение СОЭ, лихорадка, артрит, крапивница, фотосенсибилизация, «приливы» крови к коже лица, одышка, волчаночноподобный

волчаночноподобный синдром, эозинофилия. *Со стороны кожных покровов*: редко кожная сыпь, зуд, алопеция, дерматомиозит. *Со стороны опорно-двигательного аппарата:* миопатия, миалгия, судороги мышц, слабость; редко - рабдомиолиз. *Со стороны дыхательной системы*: интерстициальные заболевания легких. *Со стороны лабораторных показателей:* гипергликемия*. *Прочие:* анемия, сердцебиение, острая почечная недостаточность (вследствие рабдомиолиза), снижение потенции. *следует учитывать при диагностике сахарного диабета II типа.	синдром, эозинофилия. *Со стороны кожных покровов*: кожная сыпь, зуд, алопеция, дерматомиозит. *Со стороны опорно-двигательного аппарата:* миопатия, миалгия, судороги мышц, слабость; рабдомиолиз. *Со стороны дыхательной системы*: интерстициальные заболевания легких. *Со стороны лабораторных показателей:* повышение концентрации гликозилированного гемоглобина*, повышение активности гамма-глутамилтрансферазы. *Прочие:* анемия, острая почечная недостаточность (вследствие рабдомиолиза), снижение потенции. *следует учитывать при диагностике сахарного диабета II типа.

Заместитель руководителя отдела регистрации ЛС Гордеева Н.Г.

Исполнитель:

Специалист отдела регистрации ЛС Душкина М.Р.