ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Антифлат Ланнахер

18.05.10

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Антифлат Ланнахер

Международное непатентованное название (МНН): симетикон

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь

Состав: 1 мл суспензии для приема внутрь содержит: активное вещество – симетикон* 41,2 мг; вспомогательные вещества: гиэтеллоза, макрогола глицерилтриолеат, макрогол 6000, алюмосиликат магния Тип II А, сорбиновая кислота, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат, натрия сахарината дигидрат, натрия цикламат, ароматизатор банановый, вода очищенная.

---

* Симетикон состоит из 97 % диметикона и 3 % гидрофобного кремния диоксида.

Описание. Суспензия почти белого цвета с характерным запахом банана.

Фармакотерапевтическая группа: Ветрогонное средство.

Код АТХ: A03AX

Фармакологическое действие

Уменьшает газообразование в желудочно-кишечном тракте. Активное вещество – симетикон, являясь поверхностно-активным веществом, затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков. Высвобождаемые при этом газы могут поглощаться стенками кишечника или выводиться из организма естественным путем, благодаря перистальтике кишечника. Прием препарата перед началом соно- и рентгенографических исследований предупреждает дефекты изображения, вызываемые пузырьками газа. Способствует лучшему орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастными препаратами, препятствуя разрыву контрастной пленки.

Фармакокинетика

Вследствие физической и химической инертности не всасывается в организме, после прохождения через желудочно-кишечный тракт выводится в неизмененном виде.

56861

Показания к применению

Симптоматическая терапия:

- усиленное газообразование и накопление газов в желудочно-кишечном тракте:
  - метеоризм, аэрофагия - в т.ч. у новорожденных и грудных детей;
  - синдром Ремгельда;
  - образование газов в послеоперационном периоде;
- подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза;
- профилактика образования пены при гастроскопии;
- отравление моющими средствами (поверхностно-активными веществами) – в качестве пеногасителя.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из компонентов препарата;
- кишечная непроходимость;
- обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Беременность и лактация

Симетикон не всасывается в желудочно-кишечном тракте, поэтому препарат Антифлат Ланнахер можно применять при беременности и лактации. Тем не менее, принимать суспензию в этом случае следует не более 3 дней подряд, после чего следует сделать 2-недельный перерыв.

Способ применения и дозы

Суспензия Антифлат Ланнахер особенно удобна при назначении новорожденным, детям, пожилым пациентам и пациентам с затруднением жевания.

Суспензию следует принимать после еды или вместе с едой, добавляя в теплые и холодные напитки (чай, воду, молоко), а также в бутылочки с детским питанием.

Суспензия для приема внутрь находится во флаконах коричневого стекла, снабженных мерным насосом.

Перед применением флакон с препаратом следует хорошо встряхнуть.

Использование мерного насоса:

1. Снять колпачок
2. Привинтить мерный насос к горлышку флакона
3. Привести насос в рабочее положение I (см рисунок на крышке),

нажимать на него вплоть до появления жидкости. Первые 2 порции не использовать.

4. Во время использования флакон следует держать вертикально.

5. Для закрытия мерного насоса повернуть его вправо – в нерабочее положение 0 (см рисунок на крышке).

Дозы:

- При усиленном газообразовании и метеоризме:
  - новорожденным и детям до 6 лет: по 2 порции* (1 мл) на каждую бутылочку с детским питанием (принимать с каждым приемом пищи);
  - детям от 6 до 15 лет: по 2 порции (1 мл) с каждым приемом пищи или после него (при необходимости препарат можно запивать водой), еще 2 порции (1 мл) можно принять на ночь;
  - детям старше 15 лет и взрослым: по 2-4 порции (1-2 мл) с каждым приемом пищи или после него (при необходимости препарат можно запивать водой), еще 2 порции можно принять на ночь.
- При подготовке к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза взрослым принимать по 4-6 порций (2-3 мл) после каждого приема пищи в течение 1 дня до исследования, и 4-6 порций (2-3 мл) утром, в день исследования.
- В случае лечения отравления моющими средствами доза препарата зависит от тяжести отравления. Минимальная рекомендованная доза – 10 порций (5 мл) препарата.

---

* - порция – объем суспензии, получаемый при однократном нажатии на поршень мерного насоса

Побочные эффекты

В отдельных случаях - аллергические реакции на компоненты препарата.

Взаимодействие

Случаев лекарственных взаимодействий с другими препаратами не отмечено.

Особые указания Суспензию Антифлат Ланнахер можно применять при сахарном диабете. Препарат не влияет на способность к управлению автомобилями и занятиями видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суспензия для приема внутрь 41,2 мг/мл.

По 50 мл и 100 мл во флаконы коричневого стекла, с резьбой, закрытые

завинчивающимися крышками из полиэтилена белого цвета. Каждый флакон вместе с дозирующим устройством (мерным насосом) и инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения.
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности 3 года.
Не использовать по истечении срока годности.

Отпуск из аптек. Без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения
«Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Шлоссплатц 1, А-8502 Ланнах, Австрия
Производитель готовой лекарственной формы, фасовщик, упаковщик:
«Г.Л. Фарма ГмбХ», Индустриштрассе, 1, А- 8502, Ланнах, Австрия
Выпускающий контроль качества:
«Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Шлоссплатц 1, А-8502 Ланнах, Австрия
«Г.Л. Фарма ГмбХ», Индустриштрассе, 1, А- 8502, Ланнах, Австрия
Представительство фирмы «Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ»
127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 58
тел.: (495) 797-26-90, 797-26-91; факс: (495) 797-26-92

Представитель фирмы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ "ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ" (АВСТРИЯ) LANNACHER МОСКВА

Н. Ю. Степушина

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ФГУ НЦЭСМП

56861 4