ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Антифлат Ланнахер

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Антифлат Ланнахер
Международное непатентованное название (МНН): симетикон

Лекарственная форма: таблетки жевательные

Состав: Одна таблетка содержит: активное вещество – симетикон* 42,0 мг; вспомогательные вещества: глицерилмоностеарат, плодов горького фенхеля эфирное масло, мяты перечной эфирное масло, тмина эфирное масло, декстроза, сахароза.

---

* - Симетикон состоит из 97 % диметикона и 3 % кремния диоксида

Описание. Круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Ветрогонное средство.
Код АТХ: A03AX

Фармакологическое действие
Уменьшает газообразование в желудочно-кишечном тракте. Активное вещество – симетикон, являясь поверхностно-активным веществом, затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков. Высвобождаемые при этом газы могут поглощаться стенками кишечника или выводиться из организма естественным путем, благодаря перистальтике кишечника. Прием препарата перед началом соно- и рентгенографических исследований предупреждает дефекты изображения, вызываемые пузырьками газа. Способствует лучшему орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастными препаратами, препятствуя разрыву контрастной пленки.

56683

Фармакокинетика
Вследствие физической и химической инертности симетикон не всасывается в организме, после прохождения через желудочно-кишечный тракт выводится в неизмененном виде.

Показания к применению
Симптоматическая терапия при:
- усиленном газообразовании и накоплении газов в желудочно-кишечном тракте:
  - метеоризм, аэрофагия,
  - синдром Ремгельда,
  - образование газов в послеоперационном периоде;
- подготовке к диагностическим процедурам органов брюшной полости и малого таза;
- профилактике образования пены при гастроскопии;

Противопоказания
- повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из компонентов препарата;
- кишечная непроходимость;
- обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта;
- дефицит сахаразы/изомальтазы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- детский возраст до 6 лет.

Беременность и лактация
Симетикон не всасывается в желудочно-кишечном тракте, поэтому препарат Антифлат Ланнахер можно применять при беременности и лактации.

Способ применения и дозы
Внутрь, таблетки разжевывают. Принимают препарат после еды или совместно с приемом пищи, можно с небольшим количеством жидкости.
При усиленном газообразовании и метеоризме взрослым: 1-2 таблетки 3 раза в день, при необходимости 1-2 таблетки на ночь.
При подготовке к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза у взрослых: по 2-3 таблетки после каждого приема пищи – за день до исследования, и 2-3 таблетки утром в день исследования.
Для детей старше 6 лет используют половину дозы для взрослых.

Побочные эффекты
В отдельных случаях - аллергические реакции на компоненты препарата.

Взаимодействие
Случаев лекарственных взаимодействий с другими препаратами не отмечено.

Особые указания
Таблетки жевательные содержат 0,25 г сахарозы и 0,3 г глюкозы в 1 таблетке, что соответствует 0,05 хлебным единицам. Препарат не влияет на способность к управлению автомобилями и занятиями видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска
Таблетки жевательные 42 мг.
По 10 таблеток в блистер из ПВХ/Al.
По 3 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Отпуск из аптек Без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения
«Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Шлоссплатц 1, А-8502 Ланнах, Австрия
Производитель готовой лекарственной формы, фасовщик, упаковщик:
«Г.Л. Фарма ГмбХ», Индустриштрассе, 1, А- 8502, Ланнах, Австрия
Выпускающий контроль качества:
«Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Шлоссплатц 1, А-8502 Ланнах, Австрия
Представительство фирмы «Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ»
127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 58
тел.: (495) 797-26-90, 797-26-91; факс: (495) 797-26-92

Представитель фирмы



Н. Ю. Степушина

