ЛП-№(010104)-(РГ-RU) от 03.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.05.2025 № 11861
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Симеотик®

Регистрационный номер:

Международное непатентованное или группировочное наименование: Симетикон

Торговое наименование: Симеотик®

Лекарственная форма: капсулы

Состав на одну капсулу:

Действующее вещество:

Симетикон*	40,0 мг	80,0 мг
[Диметикона (полидиметилсилоксана)	38,05 мг	76,10 мг
Кремния диоксид]		

Вспомогательные вещества оболочки:

Желатин	24,670 мг	25,140 мг
Глицерин	11,360 мг	11,580 мг
Вода очищенная	3,140 мг	3,200 мг
Натрия бензоат	0,047 мг	0,048 мг
Краситель хинолиновый желтый Е104	0,027 мг	0,028 мг
Краситель солнечный закат желтый Е110	0,007 мг	0,007 мг

*симетикон представляет собой смесь диметикона (полидиметилсилоксана) и кремния диоксида в соотношении 95:5.

Описание

Шарообразные или почти шарообразные мягкие желатиновые капсулы от желтого до оранжевого цвета со швом и гладкой поверхностью.

Содержимое капсул – бесцветная, вязкая, опалесцирующая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, другие препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта.

Код АТХ: A03AX13

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Симеотик® – препарат, уменьшающий количество газов в кишечнике. Действующее вещество – симетикон обладает поверхностной активностью и способностью снижать поверх-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.05.2025 № 11861
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ностное натяжение на границе раздела сред жидкость/газ. При этом происходит слияние пузырьков газа и разрушение пены, вследствие чего высвободившийся газ получает возможность всасываться или выводиться естественным путем под воздействием перистальтики кишечника. Применение препарата Симеотик® для подготовки к проведению диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, вызываемых пузырьками газа.

Фармакокинетика

Симетикон химически инертен, после перорального приема не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и действует только в его просвете. Не влияет на ферменты и микроорганизмы, присутствующие в ЖКТ. Выводится в неизмененном виде.

Показания к применению

Препарат Симеотик® показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет:

- избыточное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, синдром Ремхельда, аэрофагия, повышенное газообразование в послеоперационном периоде);
- подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.);
- симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией;
- острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (в качестве пеногасителя).

Противопоказания

- Гиперчувствительность к симетикону или к любому из вспомогательных веществ;
- кишечная непроходимость;
- детский возраст от 0 до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат Симеотик® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

При жалобах, связанных с избыточным газообразованием:

Взрослым по 2 капсулы 40 мг или по 1 капсуле 80 мг 3 – 5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат Симеотик® можно применять в течение длительного периода времени.

Подготовка к диагностическим исследованиям: по 2 капсулы 40 мг или по 1 капсуле

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.05.2025 № 11861
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

80 мг 3 раза в сутки за день до исследования, по 2 капсулы 40 мг или по 1 капсуле 80 мг утром в день исследования, не запивая водой.

В качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества: разовая доза для взрослых составляет 10 – 20 капсул 40 мг или 5 – 10 капсул 80 мг в один прием; дозирование зависит от тяжести интоксикации.

Педиатрическая популяция

Препарат Симеотик® противопоказан у детей в возрасте до 18 лет. Другие лекарственные формы и дозировки могут удовлетворять потребности данной группы.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Побочных эффектов при приеме симетикона не наблюдалось.

Возможно развитие аллергических реакций на вспомогательные компоненты препарата.

Передозировка

Передозировка препарата Симеотик® маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата Симеотик® с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

В случае сохранения избыточного газообразования в течение длительного времени необходимо обратиться к врачу для проведения медицинского обследования.

Вспомогательные вещества

У людей с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (краситель солнечный закат желтый) возможно возникновение реакций гиперчувствительности немедленного типа, а также реакций гиперчувствительности замедленного типа.

При возникновении любых аллергических реакций прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат Симеотик® не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций и способность к восприятию или оценке ситуации.

Форма выпуска

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.05.2025 № 11861
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Капсулы, 40 мг, 80 мг.

По 25 капсул (дозировкой 40 мг) или по 15 капсул (дозировкой 80 мг) в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 25 капсул (дозировкой 40 мг) или по 2 контурные ячейковые упаковки по 15 капсул (дозировкой 80 мг) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/ организация, принимающая претензии потребителя

АО «АВВА РУС», Россия

121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9.

Тел./факс: +7 (495) 956-75-54.

avva.com.ru

Адрес места производства

УП «Минскинтеркапс»

Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26/3.

Тел.: +375 (17) 276-01-59