

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СКИПИДАРНАЯ МАЗЬ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СКИПИДАРНАЯ МАЗЬ

Международное непатентованное или группировочное наименование: скипидар живичный.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав:

Действующее вещество:

Скипидар живичный [масло терпентинное очищенное
с содержанием α -пинена 60 %] – 20,0 г

Вспомогательные вещества:

Вазелин – 48,0 г

Вода очищенная – 24,0 г

Эмульгатор «Твердый-2» – 8,0 г

Описание: мазь белого цвета с желтоватым оттенком, с запахом скипидара.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX.

Фармакологическое действие:

Средство растительного происхождения, оказывает местнораздражающее, анальгезирующее, «отвлекающее» и антисептическое действие. Проникает через эпидермис и вызывает рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; способствует высвобождению из кожи биологически активных веществ (в т.ч. гистамина).

Показания к применению:

В качестве вспомогательного средства при ревматических болях, артралгии, невралгии, миалгии, люмбаишиалгии.

Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности или воспалительные заболевания кожных покровов в месте предполагаемого нанесения, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью:

Печеночная и/или почечная недостаточность.

Взрослым, имеющим хронические заболевания – применять с осторожностью после согласования с лечащим врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Препарат противопоказан при беременности, в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Наружно, 1-3 раза в сутки. Наносят на неповрежденные болезненные участки кожи и растирают легкими круговыми движениями. Продолжительность применения обусловлена характером заболевания.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Гиперемия и зуд кожи, аллергические реакции.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании препарата показана симптоматическая терапия.

Взаимодействие с лекарственными препаратами:

Нет сведений.

Особые указания:

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. При попадании мази в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения.

По 25 и 50 г в алюминиевые тубы с бушонами, или тубы из комбинированного материала с бушонами, или тубы ламинатные с бушонами.

По 25, 50 и 100 г в банки темного стекла с винтовой горловиной, или в банки стеклянные, или в банки, или по 50 и 100 г во флаконы полимерные.

Каждую тубу, банку или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары. Допускается укладка туб, банок или флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению (банки: 25 г по 84 шт.; 50 г по 42 шт.; 100 г по 21 шт.; тубы: 25 г по 117 шт.; 50 г по 50 шт.; флаконы: 50 г по 42 шт.; 100 г по 21 шт.).

На тубу, банку или флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку. Допускается нанесение маркировки непосредственно на тубу.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии:

АО «Самарамедпром», Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель:

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.