

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Сустэффект® скипидарный****Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Сустэффект® скипидарный**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Скипидар живичный**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения**Состав на 100 г мази***Активный компонент:*

Скипидар живичный [Масло терпентинное очищенное] – 20,0 г  
(содержание  $\alpha$ -пинена в масле терпентинном не менее 50 %)

*Вспомогательные вещества:*

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ланолин                                 | – 1,0 г  |
| Полисорбат-80 (твин-80)                 | – 0,1 г  |
| Вазелин                                 | – 48,0 г |
| Эмульгатор «Твердый-2» (Т-2), марка «А» | – 8,0 г  |
| Вода очищенная                          | – 24,0 г |

**Описание**

Мазь белого цвета с желтоватым оттенком с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

**Код АТХ:** M02AX.**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Оказывает местное раздражающее, отвлекающее и антисептическое действие. Главное действующее вещество терпентинного масла (скипидара живичного) терпен  $\alpha$ -пинен липофильно, легко проникает через эпидермис и раздражает окончания чувствительных нервов. Определенный вклад вносят и выделяющиеся под влиянием масла эндогенные

биологически активные вещества. Гистамин и другие медиаторы воспаления вызывают расширение сосудов, небольшой отек тканей, гиперемию.

Механизм отвлекающего действия объясняют тем, что в центральную нервную систему (ЦНС) поступают два потока возбуждения - с патологически измененных внутренних органов и с поверхности кожи, причем последний доминирует. Восприятие афферентной импульсации ослабляется. Кроме того, осуществляется трофическое влияние путем кожно-висцерального рефлекса (при раздражении чувствительных зон Захарьина-Геда) и по типу аксон-рефлекса (антидромно по постганглионарным симпатическим волокнам).

### **Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

### **Показания к применению**

В качестве вспомогательного средства при ревматических болях, артралгии, невралгии, миалгии, люмбаго, люмбаишиалгии.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к скипидару живичному или к любому из вспомогательных компонентов препарата, нарушение целостности или воспалительные заболевания кожных покровов в месте предполагаемого нанесения, возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

### **С осторожностью**

Печеночная и/или почечная недостаточность.

Взрослым, имеющим хронические заболевания - применять с осторожностью после согласования с лечащим врачом.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, 1-3 раза в сутки. Наносят на болезненные участки кожи, растирают легкими круговыми движениями и накладывают согревающую повязку, проводят 10-15 процедур. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Гиперемия и зуд кожи, аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании препарата показана симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Исследования взаимодействия не проводились.

### **Особые указания**

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Если мазь случайно попала в глаза, следует тщательно промыть их большим количеством проточной воды.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата Сустэфект<sup>®</sup> скипидарный не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 20 %.

По 25 г или 50 г в банки светозащитного стекла, или в тубы алюминиевые, или в тубы комбинированные (полиэтилен/алюминий), укупоренные полиэтиленовыми крышками натягиваемыми или навинчиваемыми.

На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной, бумаги писчей или самоклеящуюся этикетку.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 банок или туб по 25 г или 50 г вместе с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

**Производитель**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

**Организация, принимающая претензии потребителей**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. +7 (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru