МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
«Спирамицин-веро»
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
1,5 млн МЕ
ООО «ЛЭНС-Фарм», Россия

Регистрационный номер: ЛС-002650

Изменения № 2

Дата внесения изменения «30» мая 2012г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав *Активное вещество:* Спирамицина адипинат (в пересчете на спирамицин) 1,5 млн МЕ	**Состав** Каждый флакон содержит: *Активное вещество:* Спирамицина адипинат (в пересчете на спирамицин) – 1,5 млн МЕ
Применение при беременности и в период грудного вскармливания Отсутствует	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** У спирамицина не выявлено тератогенного действия, поэтому препарат можно применять беременным женщинам по показаниям. В период лактации применение спирамицина противопоказано, из-за возможного проникновения препарата в грудное молоко.
Влияние на способность управлять автомобилем и работу с механизмами Отсутствует	**Влияние на способность управлять автомобилем и работу с механизмами** Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Генеральный директор Н.Н. Максутова