МИНЗДРАВ РОССИИ
230822
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Дермазин®

наименование лекарственного препарата

крем для наружного применения, 1 %

лекарственная форма, дозировка

Салютас Фарма ГмбХ, Германия

наименование прозводителя, страна

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г. 230822

Старая редакция	Новая редакция
Регистрационный номер	**Регистрационный номер:**
Торговое название препарата: Дермазин®.	**Торговое наименование препарата:** Дермазин®
Международное непатентованное название сульфадиазин	**Международное непатентованное наименование:** Сульфадиазин
Состав 1 г крема для наружного применения содержит: *активное вещество:* сульфадиазин серебра 10,0 мг. *Вспомогательные вещества:*	**Состав** 1 г крема для наружного применения содержит: *Действующее вещество:* сульфадиазин серебра 10,0 мг. *Вспомогательные вещества:*

цетиловый спирт, арахиса масло (гидрогенизированное), полисорбат-60, пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная.	цетиловый спирт, арахиса масло гидрогенизированное, полисорбат-60, пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная.
Фармакологические свойства Дермазин является местным химиотерапевтическим средством для профилактики и лечения раневых и ожоговых инфекций. При нанесении на поверхность ожога сульфадиазин серебра распадается, медленно и непрерывно высвобождая ионы серебра и сульфаниламида, ингибируя рост и размножение бактериальных клеток. Дермазин крем имеет широкий спектр антибактериальной активности, включающий фактически все виды микробов, вызывающих инфицирование ожоговых и других ран на поверхности кожи: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus sp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., а также дрожжевые грибы (Candida albicans) и некоторые штаммы вируса герпеса.	**Фармакологические свойства** Дермазин® является местным химиотерапевтическим средством для профилактики и лечения раневых и ожоговых инфекций. При нанесении на поверхность ожога сульфадиазин серебра распадается, медленно и непрерывно высвобождая ионы серебра и сульфаниламида, ингибируя рост и размножение бактериальных клеток. Дермазин® крем имеет широкий спектр антибактериальной активности, включающий фактически все виды микробов, вызывающих инфицирование ожоговых и других ран на поверхности кожи: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus sp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., а также дрожжевые грибы (Candida albicans) и некоторые штаммы вируса герпеса.

Дермазин проникает в некротизированные ткани и экссудат.	Дермазин® проникает в некротизированные ткани и экссудат.
Способ применения и дозы Наружно. После хирургической обработки раны Дермазин крем наносят слоем толщиной 2-4 мм на поврежденную поверхность один-два раза в сутки до полного заживления раневой поверхности. Перед каждым повторным нанесением крема необходимо удалить предыдущий слой препарата водой или антисептическими лекарственными средствами. Дермазин можно использовать с применением стерильных повязок или без них, повязки следует менять ежедневно. При смене повязок не наблюдается болевых эффектов. Лечение Дермазином продолжают до полного заживления раневой поверхности. Способ применения крема одинаков для лечения ожогов и трофических язв.	**Способ применения и дозы** Наружно. После хирургической обработки раны Дермазин® крем наносят слоем толщиной 2-4 мм на поврежденную поверхность один-два раза в сутки до полного заживления раневой поверхности. Перед каждым повторным нанесением крема необходимо удалить предыдущий слой препарата водой или антисептическими лекарственными средствами. Дермазин® можно использовать с применением стерильных повязок или без них, повязки следует менять ежедневно. При смене повязок не наблюдается болевых эффектов. Лечение препаратом Дермазин® продолжают до полного заживления раневой поверхности. Способ применения крема одинаков для лечения ожогов и трофических язв.
Производитель *Держатель РУ*: Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна,	**Производитель** *Держатель РУ*: Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна,

Словения; *Произведено*: Салютас Фарма ГмбХ, Ланге Герен 3, 39171 Зюльцеталь, район Остерведдинген, Германия. ***Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:*** 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.	Словения; *Произведено*: Салютас Фарма ГмбХ, Ланге Герен 3, 39171 Зюльцеталь, район Остерведдинген, Германия. ***Организация, принимающая претензии потребителей:*** АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.

Руководитель группы
регистрации
новых продуктов АО
«Сандоз»

Бобрышева Е.С.