

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

**Сульфадимезин**  
(наименование лекарственного препарата)

**таблетки 500 мг**  
(лекарственная форма, дозировка)

**ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», Россия**  
(наименование производителя, страна)

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1**

Срок введения Изменения с «01» сентября 2011 г.

| <b>Старая редакция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Новая редакция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Состав:</b> на одну таблетку:</p> <p><i>Активное вещество:</i> сульфадимидин (сульфадимезин) – 500 мг.</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный, тальк, стеариновая кислота, полисорбат-80 (твин-80).</p> <p><b>Особые указания</b></p> <p>Во время лечения следует обеспечить адекватное потребление жидкости в связи с риском развития кристаллурии.</p> <p>При длительном применении необходим контроль показателей периферической крови.</p> <p><i>Влияние на способность управления транспортными средствами</i></p> <p>Не влияет на вождение автотранспорта и занятие потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.</p> | <p><b>Состав:</b> на одну таблетку:</p> <p><i>Активное вещество:</i> сульфадимидин (сульфадимезин) – 500 мг.</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный – 81 мг, тальк – 12 мг, стеариновая кислота – 5 мг, полисорбат-80 (твин-80) – 2 мг.</p> <p><b>Особые указания</b></p> <p>Во время лечения следует обеспечить адекватное потребление жидкости в связи с риском развития кристаллурии.</p> <p>При длительном применении необходим контроль показателей периферической крови.</p> <p><i>Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций:</i></p> <p>Не влияет на вождение автотранспорта и занятие потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной</p> |

| Старая редакция | Новая редакция                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
|                 | концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. |

Заместитель Генерального  
директора по развитию  
ОАО «Ирбитский химико-  
фармацевтический завод»



А.А. Троицкая