ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ - ВИАЛ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Сульфацил натрия - ВИАЛ

МНН или группировочное название: сульфацетамид

Химическое название: N-[(Аминофенил)сульфонил]ацетамид (в виде натриевой соли)

Лекарственная форма. Капли глазные

Состав.

1 мл раствора содержит 0,2 г сульфацетамида; вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, хлористоводородная кислота 1 М раствор, вода для инъекций.

Описание.

Прозрачная бесцветная или светло- желтого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа.

Противомикробное средство – сульфаниламид.

Код АТХ. S01A B04.

Фармакологическое действие.

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК и угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой кислоты и, в конечном итоге, ее активного метаболита - тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Clostridium perfingens, Bacillus antracis, Corinebacterium diphteriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii.

Фармакокинетика. При местном применении практически не всасывается.

Показания к применению.

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у новорожденных, гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации.

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности кормления грудью и у детей нет. Возможно применение сульфацетамида для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

13.11.07

Способ применения и дозы.

Закапывают в каждый конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 5-6 раз в сутки. Для профилактики бленнореи у новорожденных - по 2 капли в каждый конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 ч.

Побочное действие.

Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, аллергические реакции.

Передозировка.

Данные о передозировке отсутствуют.

Особые указания.

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Совместное применение с прокаином и дикаином снижает бактериостатический эффект сульфацил натрия. Несовместим с солями серебра.

Форма выпуска.

Капли глазные 20%. По 1 мл в тюбик-капельницу из полиэтилена. 1, 5 или 10 тюбик-капельниц вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.

Условия хранения.

Список Б. В защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года. Срок годности после вскрытия тюбик-капельницы – 28 суток.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта.

Производитель:

ООО "СТИРОЛБИОФАРМ"

Адрес: 84610, Украина, Донецкая область, г. Горловка, ул. Горловской дивизии, д. 97

Тел. +380624278563.

Произведено для: **ООО "АЛВИЛС"**

Адрес ООО «Алвилс» (в том числе для приема претензий):

111020, Россия, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а.

Тел.: (495) 250-71-61

Генеральный директор
ООО «Алвилс» В. А. Алейников

И. о. директора ИДКЭЛС А. Н. Васильев