

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Офтофон® таурин

Регистрационный номер

Торговое наименование

Офтофон® таурин

Международное непатентованное наименование или химическое (группировочное) наименование

Таурин

Лекарственная форма

Капли глазные

Состав

В 1 мл содержится:

Действующее вещество: таурин – 40 мг.

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксibenзоат (нипагин), вода очищенная.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты, применяемые в офтальмологии; другие препараты, применяемые в офтальмологии.

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Оказывает метаболическое действие. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления K^+ и Ca^{2+} , улучшения условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению

Препарат Офтофон® таурин показан к применению у взрослых в составе комплексной терапии.

- Дистрофия роговицы.
- Катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая).
- Травма роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).
- Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с β -адреноблокаторами для местного применения в офтальмологии (для улучшения оттока внутриглазной жидкости)).

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Перед применением препарата Офтофон® таурин, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

В период грудного вскармливания перед применением препарата Офтофон® таурин необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно. Препарат применяют в виде инстилляций в конъюнктивальный мешок.

При катаракте по 1–2 капли 2–4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы по 1–2 капли 2–4 раза в день в течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с местными β -адреноблокаторами) по 1–2 капли 2 раза в день за 15–20 минут до назначения одного из местных β -адреноблокаторов, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна – реакции повышенной чувствительности, аллергические реакции.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительное усиление гипотензивного действия β -адреноблокаторов (тимолола и др.) в случае совместного применения с таурином. Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции внутриглазной жидкости.

Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Офтофон таурин проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При необходимости одновременного использования других офтальмологических лекарственных препаратов (глазные капли и др.), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10–15 минут. Глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.

Для предотвращения микробной контаминации препарата необходимо избегать соприкосновения кончика флакона-капельницы или тубы с веками, кожей окологлазничной области, глазным яблоком, пальцами рук и другими поверхностями.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат (нипагин). Может вызывать аллергические реакции (в том числе и отсроченные).

Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 минут после него.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капли глазные 4 %.

По 5 мл и 10 мл во флаконы-капельницы полимерные в комплекте с пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 5 мл и 10 мл в тубы ламинатные, снабженные капельницами и крышками навинчивающимися.

Флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Хранить после первого вскрытия упаковки не более 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88; тел./факс: (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88; тел./факс: (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru