

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТАУРИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Таурин

Международное непатентованное наименование (МНН): таурин

Лекарственная форма: капли глазные

Состав: в 1 мл препарата содержится:

Действующее вещество: таурин – 40 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (нипагин) – 1,0 мг, вода для инъекций до 1,0 мл.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость

Фармакотерапевтическая группа: Препараты, применяемые в офтальмологии, Другие препараты применяемые в офтальмологии

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Оказывает метаболическое действие. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления K^+ и Ca^{2+} , улучшения условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению

Лекарственный препарат Таурин показан к применению у взрослых в составе комплексной терапии при дистрофии роговицы; катаракте (старческая, травматическая, лучевая, диабетическая); травме роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов). Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с β -адреноблокаторами (для местного применения в офтальмологии (для улучшения оттока внутриглазной жидкости)).

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Перед применением препарата Таурин, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

В период грудного вскармливания перед применением препарата Таурин необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно, путем инстилляций в конъюнктивальный мешок.

При катаракте по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с местными β -адреноблокаторами) по 1-2 капли 2 раза в день, за 15-20 минут до назначения одного из местных β -адреноблокаторов, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна - реакции повышенной чувствительности, аллергические реакции.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительное усиление гипотензивного действия местных β -адреноблокаторов (тимолола и др.) в случае совместного применения с таурином. Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции внутриглазной жидкости.

Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Таурин проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 минут после него.

При необходимости одновременного применения других офтальмологических лекарственных средств (глазные капли и др.), интервал между применениями таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций

Форма выпуска

Капли глазные 4%. По 5 или 10 мл в полиэтиленовые флаконы, герметично закрытые пробками-капельницами и крышками навинчивающимися.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

50 флаконов и 50 инструкций по медицинскому применению помещают в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии:

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»

Россия, 141190, Московская обл., г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная,
д. 3а, эт/пом/каб 2/2003/23

Тел.: 8 800 707 07 65

Internet: www.vipsmed.ru

Производитель:

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»

Россия, Московская обл., г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 3