

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Таурин Реневал**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Таурин Реневал**Международное непатентованное наименование:** таурин**Лекарственная форма:** капли глазные**Состав***Действующее вещество:*

Таурин — 40 мг

Вспомогательные вещества:

метилпарагидроксibenзоат — 1 мг

гидроксиэтилцеллюлоза — 2 мг

вода для инъекций — до 1 мл

Описание

Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: препараты, применяемые в офтальмологии; другие препараты, применяемые в офтальмологии.**Код АТХ:** S01XA**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе метаболизма цистеина.

Оказывает ретинопротекторное (при субконъюнктивальном введении) и метаболическое действие.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления катионов калия и кальция, улучшения условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению

Препарат применяют в составе комплексной терапии при дистрофии роговицы, катаракте (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая), травме роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).

Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с местными β -адреноблокаторами (для улучшения оттока внутриглазной жидкости).

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ препарата, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Отсутствуют достаточные сведения о безопасности применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания. Возможно применение таурина для лечения во время беременности и в период грудного вскармливания по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

При катаракте препарат назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с местными β -адреноблокаторами) по 1-2 капли 2 раза в день за 15-20 минут до назначения одного из местных β -адреноблокаторов, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Порядок работы с тьюбик-капельницей с клапаном:



1. Повернуть клапан и открыть тьюбик-капельницу (необходимо убедиться, что раствор находится в нижней части тьюбик-капельницы).
2. Нажать на тьюбик-капельницу и закапать необходимое количество препарата в глаза (глаз).
3. Надавить на клапан и закрыть тьюбик-капельницу после каждой процедуры.

Порядок работы с тьюбик-капельницей с винтовой горловиной:



1. Докрутить винтовую крышку тьюбик-капельницы до упора.
2. Острие, находящееся под крышкой, проколет верхушку тьюбик-капельницы.

3. Открыть тюбик-капельницу, осторожно, не касаясь пальцами верхушки тюбик-капельницы.
4. Нажать на тюбик-капельницу, зафиксировав между большим и указательным пальцами одной руки. Закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза. Необходимо избегать контактов верхушки открытой тюбик-капельницы с поверхностью глаза и руками.
5. После использования плотно закрыть винтовую крышку по часовой стрелке.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно совместное применение таурина с тимололом. Случаев негативного лекарственного взаимодействия таурина с другими препаратами, применяющимися в офтальмологии, не описано.

У пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено увеличение гипотензивного действия β -адреноблокаторов (бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола или тимолола и других) в случае совместного применения с таурином.

Особые указания

Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 минут после него. При необходимости одновременного применения других офтальмологических лекарственных средств (глазные капли и другие), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.

После вскрытия использовать в течение 90 суток.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Данные о возможности отрицательного влияния таурина при офтальмологическом применении на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих

особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами и механизмами) отсутствуют.

Форма выпуска

Капли глазные, 4 %.

По 1 мл, 1,5 мл, 2 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, изготовленные из полиэтилена высокого давления.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

1 тубик-капельницу по 1 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 5, 10 тубик-капельниц по 1 мл, 1,5 мл, 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В пачке при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия использовать в течение 90 суток.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Производитель

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес места производства

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.05.2023 № 8766
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)