

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТЕРПЕНТИННОЕ МАСЛО

Регистрационный номер

Торговое наименование

Терпентинное масло

Международное непатентованное или группировочное наименование

Терпентинное масло эфирное очищенное

Лекарственная форма

Масло для наружного применения

Состав:

Активное вещество:

Терпентинное масло эфирное очищенное – 50 мл, 100 мл

Описание

Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая, подвижная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ M02AX.

Фармакологические свойства

Средство природного происхождения, оказывает местнораздражающее, анальгезирующее, «отвлекающее» и антисептическое действие.

Проникает через эпидермис и вызывает рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; способствует высвобождению из кожи биологически активных веществ (в том числе гистамина).

Показания к применению

Препарат Терпентинное масло показан к применению у взрослых от 18 лет в составе комплексной терапии:

- невралгии,
- миалгии,
- люмбаго, люмбагии,
- артралгии,

- ревматических болях.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата,
- нарушение целостности или воспалительные заболевания кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата,
- детский возраст до 18 лет (так как эффективность и безопасность у детей не изучалась),
- беременность,
- период грудного вскармливания.

С осторожностью

Печеночная или почечная недостаточность. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно. 1-3 раза в сутки. Наносят на болезненные участки кожи, растирают легкими круговыми движениями и накладывают согревающую повязку. Проводят 10-15 процедур.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые группы пациентов

Пациенты с печеночной/почечной недостаточностью

Не требуется коррекции режима дозирования.

Дети

Безопасность и эффективность препарата Терпентинное масло у детей в возрасте от 0 до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Препарат Терпентинное масло противопоказан у детей в возрасте до 18 лет.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Гиперемия и зуд кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Терпентинное масло следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания в рот, глаза и на слизистые оболочки. При попадании масла в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения препарата допускается наложение бинтовой повязки, однако не следует накладывать воздухопроницаемых окклюзионных повязок. В случае развития после нанесения препарата кожной сыпи его использование необходимо прекратить.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Терпентинное масло не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, работать с движущимися механизмами.

Форма выпуска

Масло для наружного применения

По 50 мл или 100 мл во флаконах или флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ или ФК, укупоренных крышками навинчиваемыми пластмассовыми с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных пробками пластмассовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми; или укупоренные крышками с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом, или укупоренные крышками навинчиваемыми пластмассовыми с уплотнительным конусом или герметизирующей прокладкой, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, с защитой от детей или без защиты от детей. Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Упаковка для стационаров. От 9 до 300 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством листов-вкладышей помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ДАНСОН-РУ»

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом. 1, ком. 220,

тел: +7 (495) 580-30-60.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.01.2025 № 1509
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

**Представитель держателя регистрационного удостоверения/Производитель/организация,
принимающая претензии от потребителей**

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»,

150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Т/ф (4852) 44-38-56

e-mail: farmfab@yaroslavl.ru