ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА

Регистрационный номер:

Торговое название:
АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА

Международное непатентованное название или группировочное название:
Хлоргексидин + Тетракаин + Аскорбиновая кислота &

Лекарственная форма:
Таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку:
Активные вещества:

Хлоргексидина диацетат	2,00 мг
Тетракаина гидрохлорид	0,20 мг
Аскорбиновая кислота	50 мг

Вспомогательные вещества: левоментол, сахарин, сорбитол, кремния диоксид, магния стеарат, ароматизатор «анисовый», ароматизатор «мятный», краситель азорубин (Е-122).

Описание:
Таблетки плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более тёмными вкраплениями, со специфическим запахом. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.

Фармакотерапевтическая группа:
Антисептическое средство+местноанестезирующее средство.

Код АТХ:
[R02AA20]

Фармакологическое действие:
Антибактериальное действие хлоргексидина осуществляется за счет неспецифического связывания с фосфолипидами бактериальных клеточных мембран. Хлоргексидин может оказывать бактерицидное и бактериостатическое действие, преимущественно, в отношении грамположительных бактерий и *Candida albicans*, и в меньшей мере, против грамотрицательных бактерий. Хлоргексидин особенно активен в отношении *Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Escherichia coli, Selenomonas spp.* и анаэробных бактерий. Препарат значительно менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как *Streptococcus sanguis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella veillonella.*
Анестетик тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.
Аскорбиновая кислота является кофактором в процессе синтеза коллагена и тканевой регенерации, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.

Показания:
Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит, пародонтоз, начальная стадия ангины, состояние после тонзиллэктомии или экстракции зуба и др.).

Противопоказания:
– повышенная чувствительность к компонентам препарата;
– детский возраст до 5 лет;
– I триместр беременности.

С осторожностью: во II и III триместрах беременности по назначению врача, период лактации, сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз и почечнокаменная болезнь.

Способ применения:
Местно. Держать во рту до полного рассасывания.
- Взрослые и дети с 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа.
- Дети с 5 до 10 лет: 3 таблетки в день с интервалом 4 часа.
- Дети с 10 до 15 лет: 4 таблетки в день с интервалом 3 часа.

Побочные действия:
Аллергические реакции.
Интенсивное потребление может вызвать повреждение зубной эмали.

Передозировка:
Симптомы передозировки: головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.
Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая терапия.

Взаимодействия:
Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов. Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина.
Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов, увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов.

Особые указания:
Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод). Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.

Форма выпуска:
Таблетки для рассасывания.
По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистер ПВХ/Al.
По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.

Условия хранения:
В сухом месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

52995

Срок годности:
3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта.

Производитель:
Натур Продукт Европа Б.В.,
Твейберг 17, 5246 XL Розмален, Нидерланды
Х. тен Херкель Б.В.,
Нобельвег 6, 3899 BN Зеевольде, Нидерланды
По заказу и под контролем: Натур Продукт Европа Б.В., Нидерланды.

Представительство в России/Адрес организации принимающей претензии:
ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
Санкт-Петербург, 197022, ул. Пр. Попова, д. 37, литер А
Тел.: (812) 332-59-18

Представитель фирмы:
Старший менеджер по регистрации
Медицинского департамента
ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» С. И. Гусева

Закрытое акционерное общество "Натур Продукт Интернэшнл" Ленинградская область, город Выборг
Natural Products International

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 6
ФГУ НЦЭСМП