

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Тетрациклин

Регистрационный номер

Торговое наименование

Тетрациклин

Международное непатентованное или группировочное наименование

Тетрациклин

Лекарственная форма

Мазь глазная

Состав

В 1 г мази содержатся:

Действующее вещество: тетрациклин в пересчете на сухое вещество и активность 1000 мкг/мг - 0,01 г.

Вспомогательные вещества: ланолин безводный, вазелин.

Описание

Мазь от желтоватого до желтовато-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты для лечения заболеваний глаз. Противомикробные препараты. Антибиотики. Тетрациклин.

Код АТХ: S01AA09

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Бактериостатический антибиотик из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к подавлению синтеза белка в микробной клетке.

Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., в т.ч. *Staphylococcus aureus*, включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae* (*Diplococcus pneumoniae*), *Bacillus anthracis*, *Listeria* spp.); грамотрицательных микроорганизмов (*Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus ducreyi*, *Klebsiella pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Enterobacter* spp., *Francisella tularensis* (*Pasteurella pestis*), *Salmonella* spp., *Shigella* spp.); внутриклеточных (интрацеллюлярных) и прочих микроорганизмов (*Chlamydia trachomatis*, *Chlamydia* spp., *Mycoplasma* spp., *Rickettsia* spp., *Treponema* spp.).

К тетрациклину устойчивы микроорганизмы: *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Serratia* spp., большинство штаммов *Bacteroides* spp. и грибов, вирусы, бета-гемолитические стрептококки группы А (включая 44 % штаммов *Streptococcus pyogenes* и 74 % штаммов *Streptococcus faecalis*).

Фармакокинетика

При местном применении достигается терапевтическая концентрация тетрациклина в тканях глаза, системная абсорбция низкая. При повреждении эпителия роговицы эффективная концентрация тетрациклина во влаге передней камеры достигается через 30 мин после аппликации.

Показания к применению

Бактериальные (в т.ч. хламидийные) глазные инфекции, вызванные чувствительными к тетрациклину микроорганизмами – блефарит, блефароконъюнктивит, кератит, кератоконъюнктивит, мейбомит (ячмень), трахома.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к компонентам препарата;
- Нарушение функции печени и почек;
- Беременность;
- Период грудного вскармливания;
- Детский возраст до 8 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Местно.

Полоску мази от 0,5 до 1 см закладывают за нижнее веко:

- блефарит, блефароконъюнктивит: 3–4 раза в день в течение 5–7 дней;
- кератит, кератоконъюнктивит: 2–3 раза в день в течение 5–7 дней. Если в течение первых 3–5 дней лечения состояние не улучшается, то следует проконсультироваться с врачом;
- мейбомит (ячмень): на ночь до исчезновения симптомов воспаления;
- трахома: каждые 2–4 ч или чаще в течение 1–2 недель. При стихании воспалительного процесса препарат применяют 2–3 раза в день. Длительность курса лечения трахомы не должна превышать 1–2 месяца.

Побочное действие

Аллергические реакции, гиперемия и отек век, преходящее затуманивание зрения.

Передозировка

При применении препарата передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Пациентам, у которых после аппликации временно снижается четкость зрения, до ее восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и заниматься видами деятельности, требующими повышенного внимания.

Если в течение нескольких дней состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска

Мазь глазная 1 %.

По 2 г, 3 г, 5 г или 10 г в тубу алюминиевую, укупоренную колпачком из полиэтилена высокой плотности.

По 2 г, 3 г, 4 г, 5 г, 8 г, 10 г или 12 г в тубу ламинатную, укупоренную колпачком из полиэтилена высокой плотности.

Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Хранить после первого вскрытия упаковки не более 6 недель.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: + 7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: + 7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru