

Инструкция
по медицинскому применению препарата

Тимолол-ПОС®

Капли глазные [без консерванта] 0,25 %, 0,5%

Регистрационный номер ЛСР-001055/08

Изменение № 3

Срок введения изменений с "09" 07 20 10 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Перед каждым закапыванием нужно снимать защитный <i>синий</i> колпачок (см. рис.1). Перед первым применением препарата переверните флакон капельницей вертикально вниз и надавите на его основание (дно) несколько раз, пока на кончике	Способ применения и дозы Перед каждым закапыванием нужно снимать защитный колпачок (см. рис.1). Перед первым применением препарата переверните флакон капельницей вертикально вниз и надавите на его основание (дно) несколько раз, пока на кончике
капельницы не появится первая капля (см. рис. 2). После этого флакон готов к дальнейшему использованию. При закапывании препарата удерживайте флакон капельницей вниз, быстро и энергично надавливая на его основание (дно). Таким образом, приводится в действие механизм капельницы и извлекается только одна капля препарата. Особая	капельницы не появится первая капля (см. рис. 2). После этого флакон готов к дальнейшему использованию. При закапывании препарата удерживайте флакон капельницей вниз, быстро и энергично надавливая на его основание (дно). Таким образом, приводится в действие механизм капельницы и извлекается только одна капля препарата. Особая

конструкция системы клапанов капельницы обеспечивает всегда одинаковый размер извлекаемой капли и одинаковую скорость ее извлечения даже при очень сильном надавливании на основание флакона. Откиньте голову немного назад, слегка отведите пальцем нижнее веко и закапайте одну каплю в конъюнктивальный мешок, как описано выше (см. рис. 3). Медленно закройте глаза. После окончания процедуры сразу же герметично наденьте на капельницу защитный <i>синий</i> колпачок (см. рис.4). При закапывании следует избегать контактов кончика капельницы с поверхностью глаза и кожей.	конструкция системы клапанов капельницы обеспечивает всегда одинаковый размер извлекаемой капли и одинаковую скорость ее извлечения даже при очень сильном надавливании на основание флакона. Откиньте голову немного назад, слегка отведите пальцем нижнее веко и закапайте одну каплю в конъюнктивальный мешок, как описано выше (см. рис. 3). Медленно закройте глаза. После окончания процедуры сразу же герметично наденьте на капельницу защитный колпачок (см. рис. 4). При закапывании следует избегать контактов кончика капельницы с поверхностью глаза и кожей.
---	---

Представитель компании
Менеджер по регистрации
лекарственных средств

М.П.



Чернышева Т.В.