МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-002221/07- 060515
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Бронхикум® С
наименование лекарственного препарата

сироп
лекарственная форма, дозировка

А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 060515 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание Прозрачный или с легкой опалесценцией раствор красновато-коричневого цвета со слабым запахом меда.	**Описание** Прозрачный или с легкой опалесценцией раствор красновато-коричневого цвета со слабым запахом меда.* *На дне флакона с препаратом может образовываться осадок.
Способ применения и дозы Если врач не назначил другого режима дозирования, взрослым и подросткам назначают внутрь после еды по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза в сутки; детям от 6 до 12 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки; детям от 2 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в сутки; детям от 1 до 2 лет – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки; детям от 6 месяцев до 12 лет – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 2 раза в сутки; Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение	**Способ применения и дозы** Если врач не назначил другого режима дозирования, взрослым и подросткам назначают внутрь после еды по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза в сутки; детям от 6 до 12 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки; детям от 2 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в сутки; детям от 1 до 2 лет – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки; детям от 6 до 12 месяцев – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 2 раза в сутки. Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение

<table>
<tr><th>Старая редакция</th><th>Новая редакция</th></tr>
<tr><td>суток.
Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.</td><td>суток.
Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.
В связи с тем, что на дне флакона с препаратом возможно образование осадка, необходимо встряхивать флакон перед применением.</td></tr>
<tr><td>Особые указания
Сироп от кашля Бронхикум С содержит 5,6 объемных % спирта этилового.</td><td>Особые указания
Сироп от кашля Бронхикум® С содержит 4,9 объемных % спирта этилового.
Содержание абсолютного этилового спирта в граммах в максимальных разовых и суточных дозах препарата.
<table>
<tr><th>Максимальная разовая и максимальная суточная дозы</th><th>Количество абсолютного этилового спирта, в граммах</th></tr>
<tr><td>Взрослые и подростки</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 10 мл</td><td><0,3867</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 30 мл</td><td><1,1601</td></tr>
<tr><td>Дети от 6 до 12 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 15 мл</td><td><0,5801</td></tr>
<tr><td>Дети от 2 до 6 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 10 мл</td><td><0,3867</td></tr>
<tr><td>Дети от 1 до 2 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 2,5 мл</td><td><0,0967</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 7,5 мл</td><td><0,2900</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Старая редакция	Новая редакция
В случае, если улучшения состояния больного не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу. ***Информация для больных сахарным диабетом*** 5 мл сиропа (примерно 1 чайная ложка) соответствует 0,3 ХЕ (хлебных единиц).	*Дети от 6 до 12 месяцев* | | Разовая доза 2,5 мл | <0,0967 Суточная доза 5 мл | <0,1934 В случае если улучшения состояния больного не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу. ***Информация для больных сахарным диабетом*** 5 мл сиропа (примерно 1 чайная ложка) соответствует 0,3 ХЕ (хлебных единиц). **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами.
Претензии потребителей направлять по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр. 2. Телефон: (495) 721-14-00. Факс: (495) 721-14-11.	**Претензии потребителей направлять по адресу в России:** 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22. Телефон: (495) 721-14-00. Факс: (495) 721-14-11.

Менеджер по регистрации — подпись — Кошель А.Ю. (ФИО)