ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ТУССАМАГ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата
ТУССАМАГ

Лекарственная форма
Сироп

Состав
100 г сиропа содержат:
Активный компонент:
тимьяна травы экстракт жидкий спиртовой 9,0 г
Вспомогательное вещество:
натрия бензоат, каштана листьев экстракт густой спиртовой, кислота хлористоводородная 25 %, глицерол 85 %, церестар карамель 15750, сахароза 66,5 %, вода очищенная.

Описание
Жидкость коричневого цвета с характерным запахом тимьяна

Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Кода АТХ: R05CA

Фармакологическое действие
Препарат оказывает отхаркивающее действие; разжижает мокроту и уменьшает ее вязкость, тем самым способствует лучшему её отхождению.

Показания к применению
Заболевания дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (бронхиты, трахеиты, трахеобронхиты и др.).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, почечная и/или печеночная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 1 года).
С осторожностью: сахарный диабет (в связи с наличием сахара в составе препарата).

Способ применения и дозы
Внутрь, желательно после еды.
Если врач не назначил иной дозировки, то препарат принимают:
- взрослые: 3-4 раза в день по 2-3 чайные ложки (10-15 мл);
- дети старше 5 лет и подростки: 3-4 раза в день по 1-2 чайные ложки (5-10 мл);
- дети от 1 года до 5 лет: 2-3 раза в день по 1 чайной ложке (5 мл).

Побочные действия
Возможны аллергические реакции, тошнота.

Передозировка
До настоящего времени сведения о случаях передозировки отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это препятствует откашливанию разжиженной мокроты.

Особые указания
Препарат содержит 4 объемн.% спирта этилового.
Не замораживать!
Препарат содержит растительный экстракт, в с вязи с чем возможно легкое помутнение раствора или появление осадка во флаконе, однако это не влияет на эффективность препарата.
Больным сахарным диабетом следует обратить внимание на содержание сахара. В 5 мл (1 чайной ложке) сиропа содержится 3,3 г сахарозы (соответственно 0,28 ХЕ).

Форма выпуска
Сироп.
По 200 г препарата во флакон темного стекла и пластмассовым навинчиваемым колпачком. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения
При температуре не выше 30 ^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Дистрибьютор:
«ратиофарм ГмбХ», Ульм, Германия
Производитель:
«Меркле ГмбХ», Блаубойрен, Германия,
Представительство в России:
123001, г. Москва, Вспольный пер., 19/20, стр.2
Тел. (495) 232-1247, Факс (495) 232-1369

И.о. директора ИДКЭЛС С.В. Буданов

Руководитель отдела регистраций Е.В. Моргунова