

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
БРАЛЬХИУМ

Регистрационный номер

Торговое наименование

Бральхиум

Международное непатентованное или группировочное наименование

Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]

Лекарственная форма

Сироп

Состав

1 г препарата содержит:

Действующие вещества: Чабреца экстракт жидкий – 0,12 г, Калия бромид – 0,01 г

Вспомогательные вещества: Сахарный сироп (сахарозы раствор 64 %) – 0,82 г,

Спирт этиловый (этанол) 95 % - 0,0406 г, Вода очищенная – 0,0094 г

Описание

Густая жидкость коричневого цвета с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Код АТХ R05CA

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат. Чабреца экстракт жидкий оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Калия бромид снижает возбудимость центральной нервной системы.

Показания к применению

Препарат Бральхиум показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 до 18 лет в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний; трахеитов, бронхитов, а также при коклюше.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ;
- заболевания печени;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга;
- эпилепсия;
- хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);
- дефицит сахарозы/изомальтозы;

- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбация;
- беременность, период грудного вскармливания;
- детский возраст (до 3 лет).

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет – по $\frac{1}{2}$ - 1 чайной ложке 3 раза в день;

детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайные ложки 3 раза в день;

детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, изжога.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В случае передозировки препарата возможна тошнота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 8-11% этанола. Содержание абсолютного этилового спирта (этанола) составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) – до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) – до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых – 3 столовые ложки (45 мл) – содержится до 3,9 г абсолютного этилового спирта (этанола).

Указание для пациентов с сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,22 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) – примерно 0,44 ХЕ; в 1 столовой ложке – примерно 0,66 ХЕ.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Сироп. По 100 г во флаконах/флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы, или укупоренных пробками из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы и крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы, или укупоренных крышками с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом из полиэтилена; или укупоренных крышками навинчиваемыми с уплотнительным конусом или с герметизирующей прокладкой, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, с защитой от детей или без защиты от детей из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы, или укупоренных колпачками алюминиевыми.

Или по 100 г во флаконах полимерных из полиэтилентерефталата, или полиэтилена высокого давления или низкого давления в комплекте с укупорочными средствами из полиэтилена или полипропилена; или укупоренных крышками с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом из полиэтилена, или укупоренных колпачками из полиэтилена или полипропилена; или укупоренных крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы; или укупоренных пробками и крышками навинчиваемыми, или крышками навинчиваемыми с уплотнительным конусом или с герметизирующей прокладкой с защитой от детей или без защиты от детей, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы.

Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Допускается каждый флакон/флакон-капельницу комплектовать мерной ложкой или мерным стаканчиком.

Упаковка для стационаров. По 20, 24 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ДАНСОН-РУ»

Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1,
ком.220; Тел: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»,
Российская Федерация, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5
Тел: (4852) 44-38-56
e-mail: farmfab@yaroslavl.ru