

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пертуссин-ЭКОлаб

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Пертуссин-ЭКОлаб**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Тимьяна ползучего травы экстракт + [Калия бромид]**Лекарственная форма:** сироп**Состав (на 100 г):***Действующие вещества:*

Чабреца экстракт жидкий	12,0 г
Калия бромид	1,0 г

Вспомогательные вещества:

Сахароза	52,48 г
Этанол (спирт этиловый) 95 %	3,975 г
Вода очищенная	30,545 г

Описание: густая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с ароматным запахом.**Фармакотерапевтическая группа:** препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства**Код АТХ:** R05CA**Фармакологические свойства:** комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Бромид калия снижает возбудимость центральной нервной системы.**Фармакокинетика:** данные отсутствуют.**Показания к применению:** препарат Пертуссин-ЭКОлаб показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 до 18 лет в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, а также у детей при коклюше.

Противопоказания: гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), беременность, период грудного вскармливания, непереносимость фруктозы, дефицит сахарозы/изомальтозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 3 лет).

С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы: препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым - по 1 столовой ложке 3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет – по 1/2 - 1 чайной ложке 3 раза в день;

детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайной ложке 3 раза в день;

детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Курс лечения 10 – 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, изжога.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка: симптомы: возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания: препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного этилового спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 1,3 г.

В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) - содержится до 3,9 г абсолютного этилового спирта.

Указание для пациентов сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) - примерно 0,64 ХЕ; в 1 столовой ложке - примерно 0,96 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: в период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска: сироп.

По 100 г во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками из полиэтилена низкого давления.

По 100 г во флаконы оранжевого стекла марки ОС-1, либо во флаконы коричневого стекла, укупоренные колпачками из полиэтилена низкого давления или крышками пластмассовыми.

На каждый флакон наносят этикетку самоклеящуюся.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению и мерным стаканчиком, либо мерной ложкой помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку.

Условия хранения: в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 4 года. Не применять по истечении срока годности!

Условия отпуска: отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1
тел. 8-800-333-33-47

Производитель

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1

Производитель (выпускающий контроль качества)

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1а

Организация, принимающая претензии

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1, д. 1а
тел. 8-800-333-33-47
e-mail: ekolab-ook@ekolab.ru