ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата Бронхикум ®С (Bronchicum ®S)

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Бронхикум® С.

Лекарственная форма: сироп.

Состав
В 100 мл сиропа содержится:
-активный компонент: экстракт травы тимьяна жидкий - 15 г;
(соотношение травы тимьяна к экстрагенту 1:2-2,5).
Экстрагент: раствор аммиака 10 % (масса/масса), глицерол 85 %, этанол 90 % (об/об), вода - в соотношении 1:20:70:109;
- вспомогательные компоненты:
натрия бензоат, розы масло, ароматизатор медовый, ароматизатор вишневый (сок вишневый концентрированный), сахарный сироп инвертный (сахароза, декстроза, фруктоза), декстроза жидкая (глюкоза жидкая), сахарный сироп 67% (сахароза), лимонной кислоты моногидрат, вода очищенная.

Описание: прозрачный или с легкой опалесценцией раствор красновато-коричневого цвета со слабым запахом меда.

Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.
Код АТХ: R05CA.

Фармакологические свойства
Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению
В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 6 месяцев).
В связи с содержанием в препарате этилового спирта сироп Бронхикум С не должен использоваться у больных алкоголизмом.

С осторожностью **и только после консультации с врачом следует принимать сироп пациентам** с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

Применение при беременности и кормлении грудью
Препарат не рекомендуется при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Если врач не назначил другого режима дозирования, взрослым и подросткам назначают внутрь после еды по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза в сутки;
детям от 6 до 12 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки;
детям от 2 до 6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в сутки;
детям от 1 года до 2 лет - по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки;
детям от 6 месяцев до 12 лет - по ½ чайной ложке (2,5 мл) 2 раза в сутки;
Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.
Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.

Побочное действие
В редких случаях возможны следующие реакции:
аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, а также отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке).
со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, гастрит, диспепсия.
В этих случаях, а также в случае развития каких-либо нежелательных явлений, е указанных в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка
Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме сиропа от кашля Бронхикум С.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременных прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания
Сироп от кашля Бронхикум С содержит 5,6 объемных % спирта этилового.
В случае, если улучшения состояния больного не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом
5 мл сиропа (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0,3 ХЕ (хлебных единиц).

Форма выпуска
По 100 мл в стеклянный флакон с навинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия, на которую надет пластмассовый стаканчик-дозатор. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению упакован в картонную пачку.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.
После вскрытия флакона сироп от кашля можно принимать в течение 3 месяцев.

Условия хранения
При температуре ниже +25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Произведено А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия.
Наттерманналлее 1, Д-50829, Кёльн, Германия.

Претензии потребителей направлять по адресу:
115035, Москва, ул. Садовническая, дом 82, стр. 2.
Телефон: (495) 721-14-00.
Факс: (495) 721-14-11.

И.о. директора ИДКЭЛС С.В. Буданов

Представитель фирмы А.Б. Раскуражев