МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Бронхикум® С
наименование лекарственного препарата

сироп
лекарственная форма, дозировка

А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия
наименование производителя, страна

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 27 12 18 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Бронхикум® С (Bronchicum® S)**	ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата Лазолван® ФИТО
Торговое название препарата: Бронхикум® С.	**Торговое наименование**: Лазолван® ФИТО.
Противопоказания Повышенная индивидуальная чувствительность к тимьяну или любому другому растению из семейства Яснотковые (Lamiaceae), а также к другим компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения	**Противопоказания** Повышенная индивидуальная чувствительность к тимьяну или любому другому растению из семейства Яснотковые (Lamiaceae), а также к другим компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения

Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Санофи-авентис Групп» (Франция) «Sanofi-aventis groupe» (France) Отдел регистрации 15607151 Москва

Изменение № 5 к Инструкции по медицинскому применению

<table>
<tr><th>Старая редакция</th><th>Новая редакция</th></tr>
<tr><td>функции печени и почек, детский возраст (до 6 месяцев).
В связи с содержанием в препарате этилового спирта сироп Бронхикум С не должен использоваться у больных алкоголизмом.</td><td>функции печени и почек, детский возраст (до 6 месяцев).
В связи с содержанием в препарате этилового спирта эта лекарственная форма (сироп) не должна использоваться у пациентов с алкоголизмом.</td></tr>
<tr><td>Передозировка
Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме сиропа от кашля Бронхикум С.</td><td>Передозировка
Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме препарата Лазолван® ФИТО, сироп.</td></tr>
<tr><td>Особые указания
Сироп от кашля Бронхикум® С содержит 4,9 объемных % спирта этилового.
Содержание абсолютного этилового спирта в граммах в максимальных разовых и суточных дозах препарата.
<table>
<tr><th>Максимальная разовая и максимальная суточная дозы</th><th>Количество абсолютного этилового спирта, в граммах</th></tr>
<tr><td>Взрослые и подростки</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 10 мл</td><td><0,3867</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 30 мл</td><td><1,1601</td></tr>
<tr><td>Дети от 6 до 12 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 15 мл</td><td><0,5801</td></tr>
<tr><td>Дети от 2 до 6 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 10 мл</td><td><0,3867</td></tr>
<tr><td>Дети от 1 до 2 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 2,5 мл</td><td><0,0967</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 7,5 мл</td><td><0,2900</td></tr>
<tr><td>Дети от 6 до 12 месяцев</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 2,5 мл</td><td><0,0967</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
</table>
В случае если улучшения состояния</td><td>Особые указания
Сироп Лазолван® ФИТО содержит 4,9 объемных % спирта этилового.
Содержание абсолютного этилового спирта в граммах в максимальных разовых и суточных дозах препарата.
<table>
<tr><th>Максимальная разовая и максимальная суточная дозы</th><th>Количество абсолютного этилового спирта, в граммах</th></tr>
<tr><td>Взрослые и подростки</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 10 мл</td><td><0,3867</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 30 мл</td><td><1,1601</td></tr>
<tr><td>Дети от 6 до 12 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 15 мл</td><td><0,5801</td></tr>
<tr><td>Дети от 2 до 6 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 10 мл</td><td><0,3867</td></tr>
<tr><td>Дети от 1 до 2 лет</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 2,5 мл</td><td><0,0967</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 7,5 мл</td><td><0,2900</td></tr>
<tr><td>Дети от 6 до 12 месяцев</td><td></td></tr>
<tr><td>Разовая доза 2,5 мл</td><td><0,0967</td></tr>
<tr><td>Суточная доза 5 мл</td><td><0,1934</td></tr>
</table>
В случае если улучшения состояния</td></tr>
</table>



Изменение № 5 к Инструкции по медицинскому применению

Старая редакция	Новая редакция
пациента не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу. ***Информация для пациентов с сахарным диабетом*** 5 мл сиропа (1 мини-пакет или примерно 1 чайная ложка) соответствует 0,3 ХЕ (хлебных единиц).	пациента не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу. ***Информация для пациентов с сахарным диабетом*** 5 мл сиропа (1 мини-пакет или примерно 1 чайная ложка) соответствует 0,3 ХЕ (хлебных единиц).

Специалист по регистрации _____ Душкина М.Р.

