

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Липоевая кислота


таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг и 600 мг

ОАО «Марбиофарм», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » ____ 20 ____ г.

160421



Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Принимают внутрь по 600 мг 1 раз в день. Таблетки принимают натощак, приблизительно за 30 минут до первого приема пищи, не разжевывая и запивая достаточным количеством воды. Минимальный курс приема препарата – 3 месяца. В некоторых случаях прием препарата предполагает более длительное применение, сроки которого определяются лечащим врачом.	Способ применения и дозы Таблетки принимают внутрь, по 600 мг (1 таблетка 600 мг или 2 таблетки 300 мг) 1 раз в сутки. Препарат принимают натощак, за 30 минут до завтрака, не разжевывая и запивая достаточным количеством воды. В тяжелых случаях лечение начинают с назначения препаратов тиоктовой кислоты в лекарственных формах для парентерального введения в течение 2-4 недель, затем пациента переводят на лечение пероральными формами препаратов тиоктовой кислоты. Продолжительность курса лечения и необходимость его повторения определяются врачом.

Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм»

М.А. Толмачев



134192