

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТОЛОФИТИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ТОЛОФИТИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: Толокнянки обыкновенной листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав на одну таблетку*Активный компонент*

Толокнянки экстракт сухой – 0,050 г
с содержанием суммы фенологликозидов
в пересчете на арбутин и абсолютно сухое
вещество не менее 25 %

Вспомогательные вещества ядра

[сахар молочный (лактоза), крахмал – до получения таблетки
картофельный, поливинилпирролидон без оболочки массой 0,2 г
низкомолекулярный медицинский
(повидон), магния стеарат]

Вспомогательные вещества оболочки

[оксипропилметилцеллюлоза – до получения таблетки,
(гипромеллоза), макрогол 6000 (поли- покрытой оболочкой,
этиленгликоль 6000), краситель азорубин массой 0,222 г
(кислотный красный 2С), титана двуокись
пигментная (титана диоксид)]

Описание

Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, темно-красного цвета с фиолетовым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Оказывает противовоспалительное, диуретическое, антисептическое действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей (цистит, уретрит).

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- острая почечная недостаточность;
- острый гломерулонефрит;
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- беременность;
- возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды.

По 1-2 таблетки 3 раза в день. Продолжительность курса 7-14 дней.

Повторный курс – через 3 месяца по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; окрашивание мочи в темно-зеленый цвет.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: при приеме больших доз препаратов толокнянки или при их длительном применении может наблюдаться обострение воспалительных заболеваний почек в результате длительного раздражения почечных канальцев.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестно.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Вспомогательные вещества

Препарат ТОЛОФИТИН содержит лактозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы лопарей или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14

Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru