

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**УРИФЛОРИН®****Регистрационный номер:****Торговое наименование препарата:** Урифлорин®**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Толокнянки
обыкновенной листья**Лекарственная форма:** таблетки**Состав на одну таблетку:**

Активный компонент:

Толокнянки обыкновенной листья - 300 мг

Вспомогательные вещества:

Лактозы моногидрат - 127 мг

Крахмал картофельный - 30 мг

Целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ-200) - 70 мг

Коповидон - 6 мг

Кросповидон - 19 мг

Кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 3 мг

Кальция стеарат - 5 мг

Масса таблетки - 560 мг

Описание: круглые таблетки от светло-зеленого до темно-зеленого цвета, с более светлыми и более темными вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Линия разлома (риска) предназначена исключительно для разламывания таблетки с целью облегчения проглатывания, а не для деления на равные дозы.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии

Код АТХ: G04BX**Фармакологические свойства**

Препарат оказывает диуретическое, противовоспалительное и антисептическое действие.

Фармакодинамика

Диуретические и уроантисептические свойства листьев толокнянки связаны с фенольными гликозидами арбутином и метиларбутином, а также с гидрохиноном и его метиловым эфиром, которые оказывают противомикробное и местнораздражающее

действие. Флавоноиды листьев толокнянки усиливают диурез, что приводит к интенсивному выведению из организма ионов натрия и хлора.

Противомикробная активность обусловлена дубильными веществами и фенологликозидами. В основе противомикробного эффекта дубильных веществ лежит их способность образовывать комплексные соединения с белками микроорганизмов.

Фармакокинетика

Препарат содержит комплекс биологически активных веществ, основным из которых является арбутин. Арбутин быстро всасывается при пероральном применении. Расщепление арбутина с образованием свободного гидрохинона происходит под влиянием ферментов кишечной микрофлоры, в частности кишечной палочки. После всасывания в кишечнике гидрохинон метаболизируется в печени, где образуются конъюгаты с глюкуроновой и серной кислотами. Глюкуронид и сульфат гидрохинона интенсивно выводятся из организма с мочой через несколько часов. Наибольшая экскреция наблюдается в первые 6 часов. 70 -75% принятой дозы выделяется через 24 часа.

Показания к применению

Урифлорин[®] показан к применению у взрослых старше 18 лет в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей (циститы, уретриты).

Противопоказания

Гиперчувствительность к активному веществу, острая почечная и печеночная недостаточность, острый гломерулонефрит, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью

При гломерулонефритах (возможно раздражение почечной паренхимы).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказанно при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 30-40 минут после еды. По 1 таблетке 3-4 раза в день. Курс лечения – 20-25 дней; при необходимости лечение повторяют через 10-12 дней (проводят не более 4-х курсов в год).

Безопасность и эффективность препарата Урифлорин[®] у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; тошнота, рвота, диарея.

При длительном применении препарата (более 1 месяца) может наблюдаться обострение воспалительных явлений в мочевыводящей системе в результате длительного раздражения почечных канальцев.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано. При приеме препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При приеме препарата моча окрашивается в темно-зеленый цвет.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата.

Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает выраженное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

Одну, две или три контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д.1

тел. +7 (495) 956-05-71

www.mosfarma.ru