МИНЗДРАВ РОССИИ
ПН014846/01-050220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мидокалм-Рихтер

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг + 2,5 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 050220 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы *Взрослым* ежедневно по 1 мл (100 мг толперизона) 2 раза в сутки, внутримышечно или по 1 мл (100 г толперизона) 1 раз в день внутривенно, медленно. *Пациенты с почечной недостаточностью* Опыт применения толперизона у пациентов с почечной недостаточностью ограничен, у данной категории пациентов чаще возникали нежелательные реакции. Поэтому у пациентов с нарушениями функции почек средней степени необходимо проводить подбор дозы толперизона с тщательным наблюдением за состоянием здоровья пациента и контролем функции почек. При тяжелом поражении почек назначение толперизона не рекомендуется. *Пациенты с печеночной недостаточностью* Опыт применения толперизона у пациентов с	**Способ применения и дозы** *Взрослым* ежедневно по 1 мл (100 мг толперизона) 2 раза в сутки, внутримышечно или по 1 мл (100 мг толперизона) 1 раз в день внутривенно, медленно. *Пациенты с почечной недостаточностью* Опыт применения толперизона у пациентов с почечной недостаточностью ограничен, у данной категории пациентов чаще возникали нежелательные реакции. Поэтому у пациентов с нарушениями функции почек средней степени необходимо проводить подбор дозы толперизона с тщательным наблюдением за состоянием здоровья пациента и контролем функции почек. При тяжелом поражении почек назначение толперизона не рекомендуется. *Пациенты с печеночной недостаточностью* Опыт применения толперизона у пациентов с

Старая редакция	Новая редакция
печеночной недостаточностью ограничен, у данной категории пациентов чаще возникали нежелательные реакции. Поэтому у пациентов с нарушениями функции печени средней степени необходимо проводить подбор дозы толперизона с тщательным наблюдением за состоянием здоровья пациента и контролем функции печени. При тяжелом поражении печени назначение толперизона не рекомендуется. *Применение у детей* Препарата Мидокалм-Рихтер не предназначен для применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет.	печеночной недостаточностью ограничен, у данной категории пациентов чаще возникали нежелательные реакции. Поэтому у пациентов с нарушениями функции печени средней степени необходимо проводить подбор дозы толперизона с тщательным наблюдением за состоянием здоровья пациента и контролем функции печени. При тяжелом поражении печени назначение толперизона не рекомендуется. *Применение у детей* Препарат Мидокалм-Рихтер не предназначен для применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Заместитель Директора Представительства
ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва Волович Н.В.