ЛП-№(014688)-(РГ-RU) от 28.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гепон

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Гепон

Международное непатентованное или группировочное наименование: треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Состав на 1 мл

Действующее вещество:

Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон)	1,0 мг

Вспомогательное вещество

Вода для инъекций	до 1,0 мл

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гепон оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие:

- вызывает продукцию альфа- и бета- интерферонов;
- мобилизует и активирует макрофаги;
- ограничивает выработку противовоспалительных цитокинов (интерлейкины-1, 6, 8 и фактор некроза опухоли);
- стимулирует продукцию антител к различным антигенам инфекционной природы;
- подавляет репликацию вирусов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Благодаря указанным фармакологическим свойствам, Гепон повышает резистентность организма в отношении инфекций, вызванных вирусами, бактериями и грибами. Гепон оказывает противовоспалительный эффект в течение 1–2 дней после применения.

У пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), Гепон снижает концентрацию ВИЧ в клетках крови и в плазме, одновременно активирует иммунные реакции, специфичные в отношении ВИЧ:

- увеличивает содержание $CD4^+$ Т клеток и NK клеток;
- повышает функциональную активность нейтрофилов и $CD8^+$ Т клеток, являющихся ключевыми звеньями защиты организма от бактерий, вирусов и грибов;
- усиливает выработку антител, специфичных к антигенам ВИЧ, а также антигенам возбудителей оппортунистических инфекций, актуальных для данного больного;
- предупреждает рецидивы оппортунистических инфекций в течение 3–6 месяцев.

Фармакокинетика препарата не изучалась в связи с его пептидной природой.

Показания к применению

- Лечение ВИЧ-инфекции;
- лечение и профилактика оппортунистических инфекций, вызванных бактериями, вирусами или грибами.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамату (Гепону);
- детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение возможно только, если потенциальная польза для беременной превышает возможный вред для плода.

Гепон не рекомендуется для приема в период грудного вскармливания. При необходимости приема препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Рекомендуемая доза для взрослых и детей 12 лет и старше составляет 10 мг внутрь (*per os*) один раз в день.

Для лечения ВИЧ-инфекции рекомендуется проведение курса лечения с ежедневным приемом Гепона по 10 мг внутрь в течение 1–3 месяцев.

Для лечения оппортунистических инфекций, вызванных бактериями, вирусами или грибами, рекомендуется проведение курса лечения с ежедневным приемом Гепона по 10 мг внутрь в течение 1–3 месяцев.

Для профилактики оппортунистических инфекций, вызванных бактериями, вирусами или грибами, рекомендуется проведение курса лечения с ежедневным приемом Гепона по 10 мг внутрь в течение 1–3 недель.

Побочное действие

Не обнаружено.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, движущимися механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь, 0,1 %.

По 1 мл или 2 мл препарата во флаконы нейтрального стекла первого гидролитического класса, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатые алюминиевыми колпачками. На флаконы наклеивают этикетку.

1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

1 флакон, 1 шприц одноразовый стерильный вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

1 флакон, 1 пипетку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

ОАО «Авексима»

125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 258-45-28.

Производитель

ООО «ИММАФАРМА», 123098, Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр.11.

ЛП-№(014688)-(РГ-RU) от 28.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гепон

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Гепон

Международное непатентованное или группировочное наименование: треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения

Состав на 1 мл

Действующее вещество:

Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон)	0,2 мг

Вспомогательное вещество

Вода для инъекций	до 1,0 мл

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гепон оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие:

- вызывает продукцию альфа- и бета- интерферонов;
- мобилизует и активирует макрофаги;
- ограничивает выработку противовоспалительных цитокинов (интерлейкины-1, 6, 8 и фактор некроза опухоли);
- стимулирует продукцию антител к различным антигенам инфекционной природы;
- подавляет репликацию вирусов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Благодаря указанным фармакологическим свойствам, Гепон повышает резистентность организма в отношении инфекций, вызванных вирусами, бактериями и грибами. Гепон оказывает противовоспалительный эффект в течение 1–2 дней после применения.

У пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), Гепон снижает концентрацию ВИЧ в клетках крови и в плазме, одновременно активирует иммунные реакции, специфичные в отношении ВИЧ:

- увеличивает содержание $CD4^+$ Т клеток и NK клеток;
- повышает функциональную активность нейтрофилов и $CD8^+$ Т клеток, являющихся ключевыми звеньями защиты организма от бактерий, вирусов и грибов;
- усиливает выработку антител, специфичных к антигенам ВИЧ, а также антигенам возбудителей оппортунистических инфекций, актуальных для данного больного;
- предупреждает рецидивы оппортунистических инфекций в течение 3–6 месяцев.

Фармакокинетика препарата не изучалась в связи с его пептидной природой.

Показания к применению

- Повышение иммунной защиты от инфекций;
- лечение инфекций слизистых оболочек и кожи, вызванных грибами *Candida*;
- профилактика кандидоза слизистых оболочек и кожи в результате терапии антибиотиками;
- для уменьшения воспаления (покраснение, отек, зуд, жжение, боль) слизистых оболочек и кожи, а также сухости слизистых оболочек.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамату (Гепону);
- детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение возможно только, если потенциальная польза для матери превышает возможный вред для плода.

Гепон не рекомендуется для применения в период грудного вскармливания. При необходимости применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Способ применения и дозы

Применяют место, наружно.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей 12 лет и старше составляет 1–2 мг в виде 0,02 % раствора для местной обработки слизистых оболочек и кожи один раз в день.

Для лечения инфекций слизистых оболочек и кожи, вызванных грибами *Candida*, рекомендуется местное применение Гепона путем орошения пораженных участков слизистых и кожи 0,02 % раствором, курсом в 3 орошения с интервалом 1–3 дня между орошениями.

При вульвовагините, уретрите, цервиците у женщин применяют орошения 0,02 % раствором Гепона слизистой вульвы, влагалища, цервикса, а также примочки на пораженные участки кожи, прилегающие ко входу во влагалище.

При уретрите и баланопостите у мужчин применяют инстилляции 0,02 % раствором Гепона в уретру и примочки на пораженные участки кожи. Обработку слизистых оболочек и кожи повторяют трижды с интервалом в 1–3 дня.

Для профилактики кандидоза слизистых оболочек и кожи как возможного осложнения при антибиотикотерапии рекомендуется проводить орошения (примочки) 0,02 % раствором Гепона во время курса лечения антибиотиком.

Для снижения интенсивности воспаления слизистые оболочки следует орошать 0,02 % раствором Гепона, а на воспаленные участки кожи накладывать марлевые салфетки, смоченные 0,02 % раствором Гепона.

Побочное действие

Не обнаружено.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, движущимися механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 0,02 %.

По 5 мл или 10 мл препарата во флаконы нейтрального стекла первого гидролитического класса, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатые алюминиевыми колпачками или укупоренные насадками-распылителями. На флаконы наклеивают этикетку.

1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

1 флакон, 1 крышку-капельницу, помещенную в пакет из пленки полиэтиленовой, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

1 флакон, 1 насадку-распылитель, помещенную в пакет из пленки полиэтиленовой, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

1 флакон с насадкой-распылителем вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

1 флакон, 1 пипетку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

1 флакон, 1 шприц одноразовый стерильный вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

ОАО «Авексима»

125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 258-45-28.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.04.2026 № 8260
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Производитель

ООО «ИММАФАРМА», 123098, Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр.11.