МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**«Веро-триметазидин»**
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг
ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № _1_

Дата внесения Изменения "16 марта 2011 г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Состав**<br>1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:<br>*активное вещество:* триметазидина дигидрохлорид - 20 мг;<br>*вспомогательные вещества* до получения таблетки 100 мг: лактозы моногидрат (сахар молочный), крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, повидон (поливинилпирролидон) низкомолекулярный 12600±2700, натрия карбоксиметилкрахмал (примогель), тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат;<br>*состав оболочки:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), повидон (поливинилпирролидон) низкомолекулярный 12600±2700, макрогол (полиэтиленгликоль 4000), тальк, титана диоксид, краситель азорубин. | **Состав**<br>1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:<br>*активное вещество:* триметазидина дигидрохлорид - 20 мг;<br>*вспомогательные вещества* до получения таблетки 100 мг: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 38,8 мг, крахмал картофельный - 26,3 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 4,7 мг, повидон (поливинилпирролидон) - 4,7 мг, натрия карбоксиметилкрахмал (примогель) - 3 мг, тальк - 1 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 0,5 мг, магния стеарат - 1 мг;<br>*состав оболочки:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 2,126 мг, повидон (поливинилпирролидон) - 1,331 мг, макрогол (полиэтиленгликоль 4000) - 0,462 мг, тальк - 0,61 мг, титана диоксид - 0,462 мг, краситель азорубин - 0,009 мг. |

| | |
|---|---|
| **Применение при беременности и кормлении грудью**<br>Отсутствует | **Применение при беременности и кормлении грудью**<br>Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание. |
| **Форма выпуска**<br>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 30 таблеток в банке или флаконе из полимерных материалов. Каждая банка или флакон, или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. | **Форма выпуска**<br>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 30 таблеток в банке из полимерных материалов. Каждая банка или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. |

Зам. генерального директора
ОАО «ВЕРОФАРМ» Чибиляев Т.Х.