МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000611-210121
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Римекор

таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 20 мг

ООО «Хемофарм», Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 210121 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии (в комплексной терапии). Кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы, такие как головокружение, шум в ушах, нарушение слуха. Хориоретинальные сосудистые нарушения с ишемическим компонентом.	**Показания к применению** Длительная терапия ишемической болезни сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии в виде монотерапии или в составе комбинированной терапии.
Применение при беременности и в период лактации Препарат противопоказан при беременности в связи отсутствием клинических данных о безопасности его применения. В экспериментальных исследованиях не установлено тератогенное действие триметазидина. Неизвестно, выделяется ли триметазидин с грудным молоком. Поэтому при необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Препарат противопоказан при беременности в связи с отсутствием клинических данных о безопасности его применения. В экспериментальных исследованиях не установлено тератогенное действие триметазидина. Неизвестно, выделяется ли триметазидин с грудным молоком. Поэтому при необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

По доверенности АО «Нижфарм» О.Э. Петрушина

ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

132148