«Утверждаю»
И.о. Руководителя
Департамета Государственного
контроля лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ
А.А. Тюкуров
«03» ноября 2002 г.

Одобрено
Фармакологическим комитетом
Минздрава России
«26» 12 2002 г.
Протокол № 13/7

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ТРУВЕНТ

Регистрационный номер:
Торговое название: ТРУВЕНТ
Международное непатентованное название: Тровентол
Лекарственная форма: аэрозоль для ингаляций дозированный
Состав:
В 1 баллоне (200 доз) содержится:
Тровентол ..... 10 мг и 20 мг.
В 1 дозе содержится:
Тровентол ..... 40 мкг и 80 мкг.

Вспомогательные компоненты: 1,1,1,2-тетрафторэтан.

Описание.
Молочно-белая однородная суспензия активного вещества в сжиженном пропелленте, помещенная в алюминиевый баллон.

Фармакотерапевтическая группа.
М-холиноблокатор; Код АТХ R03BB.

Фармакологическое действие.
Бронхорасширяющее средство из группы М-холиноблокаторов. Особенностью по сравнению с атропином является более сильное и длительное влияние на холинорецепторы бронхиальной мускулатуры. Не проникает в ЦНС. Бронхорасширяющий эффект развивается через 15-30 минут после ингаляции и сохраняется в течение 4-5 часов.

Показания к применению.
Профилактика и лечение бронхоспастического синдрома при:
- Хроническом обструктивном бронхите,
- Хронической и острой пневмониях,
- Бронхиальной астме легкой и средней тяжести,
- Заболеваниях, сопровождающихся бронхоспазмом у лиц пожилого возраста.

Противопоказания.
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, закрытоугольная глаукома, беременность.

Способ применения и дозы.
При пользовании аэрозольным баллоном снимают защитный колпачок с клапанно-распылительной головки, 2-3 раза встряхивают баллон, поворачивают головкой вниз,

охватывают ее мундштук губами и, одновременно с нажатием на дно и головку баллона (это сопровождается выбросом 1 дозы аэрозоля), производят максимально глубокий вдох с последующей задержкой дыхания на несколько секунд. Вдыхают 1-2 раза (1-2 нажатия), через каждые 4-6 ч. Имеются баллоны с двумя дозировками: 10 и 20 мг. При одном нажатии на клапан баллона с 10 мг выделяется разовая доза 40 мкг, а при нажатии на клапан баллона с 20 мг - 80 мкг. Суточная доза препарата может колебаться у разных больных от 120 до 480 мкг. Начинают с назначения 40 мкг, при недостаточном эффекте производят два вдоха (доза - 80 мкг) . При необходимости увеличивают разовую дозу до 160 мкг.

Побочное действие.

Сухость во рту, "першение" в горле, паралич аккомодации, нарушение четкости зрения, повышение внутриглазного давления.
В этом случае увеличивают промежутки между ингаляциями препарата или временно их прекращают.

Особые указания.

Как и при назначении других М-холиноблокаторов, возможно сгущение мокроты, что нежелательно у больных с вязкой, плохо отходящей мокротой.

Форма выпуска.

По 200 доз в алюминиевый баллон с насадкой для перроральной ингаляции, снабженной дозирующим клапаном. По 1 баллончику вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения.

При температуре не выше 30°С, в защищенном от света и недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок годности.

2 года. Не использовать препарат позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек.

По рецепту врача.

Производитель:
"Ципла ЛТД", Индия
Телефон: (9122) 3082891, 3095521
Факс: (9122) 3061227, 3070013, 3070393
e-mail: prc cipla.com

Директор ИДКЭЛС В.В. Чельцов

Менеджер по регистрации Л.И.Чумакова