

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТЫКВЫ СЕМЕНА

(Cucurbitae semina)

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Тыквы семена.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Тыквы семена.

Лекарственная форма.

Семена цельные.

Состав.

Тыквы семена.

Характеристика.

Семена тыквы содержат жирное масло, белок, витамины группы В и др.

Описание.

Семена эллиптические, плотные, слегка суженные с одной стороны, окаймленные по краю ободком. Поверхность семян глянцевая или матовая, гладкая или слегка шероховатая. Кожура семени состоит из двух частей: деревянистой, легко отделяемой и внутренней – пленчатой, плотно прилегающей к зародышу; иногда деревянистая кожура отсутствует (сорт голосемянная). Зародыш состоит из двух желтовато-белых семядолей и небольшого корешка. Длина семени 1,5-2,5 см, ширина 0,8-1,4 см, толщина в средней части семени 0,1-0,4 см. Цвет семян белый, белый с желтоватым или сероватым оттенком, реже зеленовато-серый или желтый. Цвет семян голосемянного сорта от желтовато-зеленого до коричневатого-зеленого. Запах отсутствует. Вкус семени, очищенного от деревянистой части кожуры, и голосемянного сорта маслянистый, сладковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Антигельминтное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Семена тыквы эффективны в отношении различных ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.). По активности препарат уступает современным синтетическим средствам, но не оказывает токсического действия и не вызывает побочных эффектов.

Показания к применению.

В качестве антигельминтного средства для взрослых против различных ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.) при плохой переносимости других противоглистных препаратов, в комбинации с солевыми слабительными средствами.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату. Беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с применением при лечении солевых слабительных средств). В отношении противопоказаний для солевых слабительных средств, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям по применению этих препаратов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с использованием при лечении солевых слабительных препаратов).

Способ применения и дозы.

За 2 дня до начала применения семян тыквы пациенту ежедневно назначают утром клизму и накануне вечером - солевое слабительное. В день лечения натошак ставят клизму независимо от наличия стула.

Из семян тыквы готовят эмульсию или отвар следующими способами.

Способ 1. Тыквенные семена очищают от твердой кожуры, оставляя внутреннюю зеленую оболочку; 300 г очищенных семян растирают небольшими порциями в ступке, после последней порции ступку промывают 50-60 мл воды, сливают в тарелку с растертыми семенами и тщательно перемешивают (можно добавить 50-100 г меда). Полученную смесь пациент принимает натошак, лежа в постели, небольшими порциями в течение 1 ч; через 3 ч дают слабительное; затем через полчаса ставят клизму. Прием пищи разрешается после стула, вызванного клизмой или слабительным.

Способ 2. 500 г неочищенных семян измельчают в мясорубке или ступке, заливают двойным количеством воды и выпаривают на водяной бане на легком огне, не доводя до кипения.

ния, в течение 2 ч; отвар фильтруют через марлю, после чего с поверхности отвара снимают масляную пленку. Весь отвар принимают натошак в течение 20-30 мин. Через 2 ч после приема отвара дают солевое слабительное.

Семена тыквы голозерной (не имеющие твердой кожуры) применяют без обработки по 150-200 г на прием; используют также отвар из семян тыквы голозерной (150 г семян на 450 мл воды; кипятят на водяной бане в течение часа, остужают, процеживают через плотную ткань; доза для взрослых 400-450 мл отвара) и эмульсию (150 г семян растирают с добавлением 450 мл воды; доза для взрослых 400-450 мл эмульсии). Весь отвар принимают натошак в течение 20-30 мин. Через 2 ч после приема отвара дают солевое слабительное.

В отношении способа применения и дозы для солевых слабительных средств, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям по применению этих препаратов.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

В редких случаях возможны аллергические реакции. В отношении возможных побочных эффектов для солевых слабительных средств, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям по применению этих препаратов. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы. В отношении возможных признаков/симптомов передозировки для солевых слабительных средств, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям по применению этих препаратов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано. В отношении возможного взаимодействия с другими лекарственными препаратами для солевых слабительных средств, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям по применению солевых слабительных средств.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Семена цельные. По 50 г, 100, 150, 200 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по медицинскому применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru