

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТЫКВЕОЛ®

Наименование лекарственного средства

Тыквеол®

Лекарственная форма суппозитории ректальные 500 мг

Состав

1 суппозиторий содержит: Тыквеола – 500 мг

Вспомогательные вещества: масло какао - 1,5г

Описание

Суппозитории от светло-зеленого до темно-зеленого цвета, цилиндрической формы, с заостренным концом. На продольном срезе не должно быть вкраплений, допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на обмен веществ в предстательной железе.

Геморроя средство лечения растительного происхождения.

Код АТХ: G04CX, C05AX

Фармакологические свойства

Противовоспалительное и репаративное средство. Снижает пролиферацию клеток предстательной железы. Устраняет дизурические явления при гиперплазии предстательной железы. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителия, повышает мышечный тонус мочевого пузыря, нормализует эякуляторные показатели предстательной железы, уменьшает боль, вызванную простатитом, купирует симптомы незначительной или умеренной выраженности инфравезикальной обструкции динамического типа при простатите и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Ингибирует синтез простагландинов, что обеспечивает противовоспалительный эффект при лечении геморроя.

Показания для применения

Гиперплазия предстательной железы

Хронический простатит

Геморрой

Противопоказания для применения

Повышенная чувствительность к препарату.

Детский возраст (до 12 лет).

Режим дозирования, способ введения, продолжительность лечения

Суппозиторий освобождают от упаковки и вводят в прямую кишку после дефекации или клизмы по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки. Курс лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы - от 1 до 3 месяцев, или короткие курсы по 10 - 15 дней на протяжении 6 месяцев. При лечении геморроя по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки от 10 дней до 1 месяца

Меры предосторожности при применении

При приеме нет каких-либо ограничений, если иное не рекомендовано вашим врачом.

Симптомы передозировки

Диарея.

Лечение: симптоматическое

Возможные побочные действия

Аллергические реакции. Диарея.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не обнаружено клинически значимого взаимодействия препарата Тыквеол® с другими лекарственными средствами

Применение при беременности и в период лактации

В настоящее время нет данных об отрицательном влиянии препарата Тыквеол® суппозитории ректальные на организм беременных женщин и в период лактации

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 5°C.

Хранить лекарственный препарат в местах недоступных для детей.

Производитель

ЗАО НПО «ЕВРОПА-БИОФАРМ», 400078, г. Волгоград, ул. 2-я Горная, 4

тел. (8442) 27-11-27, 27-11-28, факс: (8442) 27-11-30, E-mail: mail@evropa-biofarm.ru

Место производства: 400040 г. Волгоград ул. Поддубного д. 33 А

Условия отпуска

Без рецепта.

Генеральный директор
ЗАО НПО «ЕВРОПА-БИОФАРМ»



В.Ю. Михалев