МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Кудевита®

капсулы 30 мг

ООО «ПИК-ФАРМА», Россия

произведено

ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», Россия
ФГУП «ЦНКБ», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «31» августа 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакодинамика Убидекаренон (коэнзим Q_{10}, убихинон) – природное вещество, являющееся витаминоподобным коферментом. Убидекаренон является эндогенным субстратом, принимает участие в переносе электронов в транспортной цепочке окислительно-восстановительных процессов, в процессе обмена энергии, в реакции окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи митохондрий	**Фармакодинамика** Убидекаренон (коэнзим Q10, убихинон) – природное вещество, являющееся витаминоподобным коферментом. Убидекаренон является эндогенным субстратом, принимает участие в переносе электронов в транспортной цепочке окислительно-восстановительных процессов, в процессе обмена энергии, в реакции окислительного фосфорилирования в дыхательной

клеток. Участвует в процессах клеточного дыхания за счет увеличения синтеза аденозинтрифосфорной кислоты. Оказывает клинически значимое антиоксидантное действие. Предохраняет липиды клеточных мембран от перекисного окисления. Сокращает зону повреждения миокарда в условиях ишемии и реперфузии. Убидекаренон не удлиняет QT интервал, улучшает переносимость физической нагрузки. За счет эндогенного синтеза 100 % удовлетворение потребности организма в коэнзиме Q10 происходит только до 20-летнего возраста. Концентрация коэнзима Q10 снижается у пациентов пожилого возраста, а также при различных заболеваниях как у взрослых, так и у детей.	цепи митохондрий клеток. Участвует в процессах клеточного дыхания за счет увеличения синтеза аденозинтрифосфорной кислоты. Оказывает клинически значимое антиоксидантное действие. Предохраняет липиды клеточных мембран от перекисного окисления, предотвращая образование свободных радикалов, тем самым замедляя процесс старения. Сокращает зону повреждения миокарда в условиях ишемии и реперфузии. Убидекаренон не удлиняет QT интервал, улучшает переносимость физической нагрузки. За счет эндогенного синтеза 100 % удовлетворение потребности организма в коэнзиме Q10 происходит только до 20-летнего возраста. Концентрация коэнзима Q10 снижается у пациентов пожилого возраста, а также при различных заболеваниях как у взрослых, так и у детей.
Показания к применению • Ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная	**Показания к применению** Профилактика и в составе комплексной терапии различных

недостаточность (II-III функционального класса по классификации NYHA) (в составе комбинированной терапии).	заболеваний сердечно-сосудистой системы: • Ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (II-III функционального класса по классификации NYHA); • Артериальная гипертензия; • Инфаркт миокарда (в период восстановительной терапии); • Период подготовки к проведению операций на сердце (аорто-коронарное шунтирование, при пороках сердца). Профилактика и в составе комплексной терапии мигрени. Для профилактики и восполнения недостаточности коэнзима Q10. Для улучшения адаптации к повышенным физическим нагрузкам у спортсменов.
Противопоказания • повышенная чувствительность к компонентам препарата; • острый гломерунефрит; • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в	**Противопоказания** • повышенная чувствительность к компонентам препарата; • острый гломерулонефрит; • язвенная болезнь желудка и

стадии обострения); • выраженная брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд/мин); • беременность и период лактации; • возраст до 18 лет; • непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.	двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения); • выраженная брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд/мин); • возраст до 12 лет; • непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Способ применения и дозы Препарат Кудевита® назначают по 150 мг (5 капсул), разделенные на 3-5 приемов в сутки после еды. Длительность курса лечения – 1-3 месяца. Увеличение продолжительности курса терапии и повторные курсы – по рекомендации врача.	**Способ применения и дозы** С целью профилактики принимать по всем заявленным показаниям взрослым и детям старше 12 лет по 30 мг (1 капсула) в сутки после еды в первой половине дня. В составе комплексной терапии при лечении хронической сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца назначают по 150 мг (5 капсул), разделенные на 3-5 приемов в сутки после еды.

	В комплексной терапии артериальной гипертензии, инфаркта миокарда (в период восстановительной терапии), в период подготовки к проведению операций на сердце (аорто-коронарное шунтирование, при пороках сердца), мигрени, для восполнения недостаточности коэнзима Q10 и улучшения адаптации к повышенным физическим нагрузкам у спортсменов, взрослым и детям старше 12 лет назначают от 30 мг (1 капсула) до 90 мг (3 капсулы) в сутки. Длительность курса применения препарата составляет 1-3 месяца. Увеличение продолжительности курса терапии и повторные курсы – по рекомендации врача.

Директор по маркетингу и продажам,
ВРИО Генерального директора
ООО «ПИК-ФАРМА» А.В.Кривов