

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

УБИХИНОН КОМПОЗИТУМ (UBICHINON COMPOSITUM)

Регистрационный номер

ЛП-№(001174)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Убихинон композитум

Лекарственная форма

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г))

Активные компоненты: Ubichinonum (Убихинонум) D10 22 мкл, Acidum ascorbicum (Ацидум аскорбикум) D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum (Тиаминум гидрохлорикум) D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum (Натриум рибофлавинум фосфорикум) D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum (Pyridoxinhydrochlorid) (Пиридоксинум гидрохлорикум (Пиридоксингидрохлорид)) D6 22 мкл, Nicotinamidum (Никотинамидум) D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus (Myrtillus) (Вацциниум миртиллюс (Миртиллюс)) D4 22 мкл, Colchicum autumnale (Colchicum) (Колхикум отумнале (Колхикум)) D4 22 мкл, Podophyllum peltatum (Podophyllum) (Подофиллюм пельтатум (Подофиллюм)) D4 22 мкл, Conium maculatum (Conium) (Кониум макулятум (Кониум)) D4 22 мкл, Hydrastis canadensis (Hydrastis) (Гидрастис канаденсис (Гидрастис)) D4 22 мкл, Acidum sarcosolacticum (Ацидум сарколяктикум) D6 22 мкл, Hydrochinonum (Гидрохинонум) D8 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (Ацидум ДЛ-альфа-липоникум (Ацидум альфа-липоникум)) D8 22 мкл, Sulfur (Сульфур) D8 22 мкл, Manganum phosphoricum (Манганум фосфорикум) D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (Натриум диэтилоксалацетикум (Натриумдиэтилоксалацетат)) D8 22 мкл, Trichinoylum (Трихиноиллюм) D10 22 мкл, Anthrachinonum (Антрахинонум) D10 22 мкл, Naphthochinonum (Нафтохинонум) D10 22 мкл, para-Benzoinum (пара-Бензоинум) D10 22 мкл, Adenosinum triphosphoricum (Аденозинум трифосфорикум) D10 22 мкл, Coenzym A (Коэнзим А) D10 22 мкл, Galium aparine (Галиум апарине) D6 22 мкл, Acidum acetylosalicylicum (Ацидум ацетилосалициликум) D10 22 мкл, Histamine (Histaminum) (Гистамин (Гистаминум)) D10 22 мкл, Nadidum (Надидум) D10 22 мкл, Magnesium gluconicum (Магнезиум глюконикум) D10 22 мкл.

вспомогательные вещества: вода для инъекций 1584 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма; интоксикационного синдрома (в том числе кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов; гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса; последствий химио- и лучевой терапии.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.
- Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
- Беременность, период грудного вскармливания в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания



Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Курс лечения 2-8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Как вскрыть ампулу?



Обращаться с осторожностью. Внимательно следуйте инструкциям по вскрытию.

**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

Находящееся в
головке ампулы
содержимое следует
стряхнуть с
помощью легкого
постукивания.

**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

После этого
отломить
верхнюю часть
ампулы путем
нажатия в
цветной точке.

После внутримышечного введения препарата вскрытую ампулу следует выбросить.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. На каждую пачку со 100 ампулами наклеивают прозрачную защитную этикетку, предохраняющую упаковку от открывания во время транспортировки.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Держатель регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25

E-mail: info_russia@heel.com