МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

УКРОПА ПАХУЧЕГО ПЛОДЫ
(Anethi graveolentis fructus)

Регистрационный номер

Торговое наименование препарата: Укропа пахучего плоды

Лекарственная форма: Плоды цельные

Состав: Укропа пахучего плоды

Характеристика
Плоды содержат фуранхромоны (виснагин и келлин), пиранокумарин (виснадин), флавоноиды, эфирное масло, жирное масло, сахара, клетчатку, каротин.

Описание
Отдельные полуплодики (мерикарпии), реже цельные плоды (вислоплодники) длиной 3 - 7 мм, шириной 1,5 - 4 мм. Мерикарпий широкоэллиптический, слабовыпуклый на спинной стороне и плоский – на внутренней. Каждый мерикарпий с тремя нитевидными спинными ребрами и двумя плоскими крыловидными боковыми. Цвет плодов зеленовато-коричневый или коричневый, ребер – желто-коричневый. Запах сильный ароматный. Вкус водного извлечения сладковато-пряный, несколько жгучий.

Фармакотерапевтическая группа
Спазмолитическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие
Оказывает спазмолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, гипотензивное, желчегонное и ветрогонное действие, способствует выработке молока у кормящих матерей.

Показания к применению
Спастические коликообразные боли в кишечнике, метеоризм, запор;
воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (в комплексной терапии).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препаратам, беременность.
С осторожностью - артериальная гипотензия

Способ применения и дозы
Около 10 г (2 столовые ложки) плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде 3 – 4 раза в сутки: взрослые и дети старше 12 лет - по 1/3 стакана; дети от 7 до 12 лет – по 1-2 столовые ложки; дети от 3 до 6 лет - по 1 столовой ложке; дети до 3 лет – по 1/2-1 чайной ложке.
Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

Передозировка.
Симптомы: снижение артериального давления. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.

Особые указания
Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска
Плоды цельные по 50 г (при влажности 12 %) в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом и инструкцией по применению

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте.
Готовый настой хранить в темном прохладном месте не более 2 суток
Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности
3 года.
Не применять по истечению срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии.
ФГУП «НПО Микроген»
Россия, 115088, г. Москва, ул.1-ая Дубровская, д.15
Тел. (495)7103787
Адрес производства
Россия, 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Аэродромная, д.15
Тел. (86155) 31178

Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»



П.В. Смачков