МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МИКОСЕПТИН®

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: МИКОСЕПТИН®
МНН или группировочное название: ундециленовая кислота +ундециленат цинка.
Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

СОСТАВ

Каждая туба (30 г мази) содержит:
активные вещества:
ундециленовая кислота 1,500 г, ундециленат цинка 6,000 г;
вспомогательные вещества:
стеариновая кислота - 0,390 г, воск пчелиный белый - 0,690 г, парафин твердый (точка плавления 64-68 °С) - 1,500 г, парафин твёрдый -1,050 г, парафин жидкий- 10,110 г, метилпарагидроксибензоат – 0,060 г, макрогола олеат - 1,200 г, моноглицериды дистиллированные - 0,990 г, парафин мягкий белый - 4,110 г, вода очищенная - 2,400 г.

ОПИСАНИЕ

От почти белого до белого со светло-желтоватым оттенком цвета мазь с характерным запахом и с мелкими жировыми зернами.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противогрибковое средство.

Код АТХ: D01AE54.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика
Ундециленовая кислота и её соли оказывают выраженное фунгистатическое действие в отношении дерматофитов рода *Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum.* Цинк, входящий в состав препарата, оказывает вяжущее действие, снижая, таким образом, проявления признаков раздражения кожных покровов, способствуя более быстрому заживлению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лечение и профилактика грибковых заболеваний кожи, вызванных чувствительными к препарату грибами (дерматофитами).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ

Прежде чем использовать препарат во время беременности и в период кормления грудью следует обязательно проконсультироваться с врачом, так как во время беременности и в период кормления грудью применение препарата возможно только при наличии строгих показаний, которые должен установить врач, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к ундециленовой кислоте и её производным, парабенам, к другим компонентам препарата; детский возраст (до 2 лет).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Для наружного применения.
Наносить на чистую, сухую поверхность поражённой кожи 2 раза в сутки. Продолжительность курса лечения 4-6 недель. После исчезновения клинических проявлений заболевания, для предотвращения рецидива рекомендуется наносить мазь 1 раз в сутки в течение недели и далее, через день или 2 раза в неделю в течение одного месяца, сокращение курса лечения повышает риск рецидива заболевания.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам препарата в виде покраснения, зуда кожных покровов, отёка, чувства жжения, кожной сыпи.
При появлении признаков повышенной чувствительности применение препарата следует прекратить и сообщить об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Данных о взаимодействии препарата МИКОСЕПТИН® с другими лекарственными средствами не получено. Возможность одновременного использования других лекарственных средств для наружного применения определяется врачом.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Препарат МИКОСЕПТИН® нельзя наносить на открытую раневую поверхность, повреждённую поверхность кожных покровов, периорбитальную зону, следует избегать попадания мази в глаза.

ФОРМА ВЫПУСКА
Мазь для наружного применения.
По 30 г мази в алюминиевую тубу. Каждая туба помещена в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре не выше 25 °С.
Хранить в месте, недоступном для детей!

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗЕНТИВА к.с., Чешская Республика
У кабеловны 130, 10237, Прага 10, Долни Мехолупы, Чешская Республика

Претензии по качеству препарата направлять
по адресу ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА»:
Россия, 119017, Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4.
Тел.: (495) 721 16 66/67/68
Факс: (495) 721 16 69

Представитель фирмы
Медицинский директор

"Зентива Фарма" LLC "Zentiva Pharma" * МОСКВА *

М.Ю.Вильчинская