



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГРИНТЕРОЛ®

наименование лекарственного препарата

капсулы, 250 мг

лекарственная форма, дозировка

АО «Гриндекс», Латвия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «09 08 21» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению - Растворение холестериновых камней желчного пузыря, - билиарный рефлюкс-гастрит, - первичный билиарный цирроз печени при отсутствии признаков декомпенсации, - хронические гепатиты различного генеза, - первичный склерозирующий холангит, - муковисцидоз (в составе комплексной терапии), - неалкогольный стеатогепатит, - алкогольная болезнь печени (АБП), - дискинезия желчевыводящих путей.	Показания к применению - Растворение холестериновых камней желчного пузыря, - билиарный рефлюкс-гастрит, - первичный билиарный цирроз печени при отсутствии признаков декомпенсации, - хронические гепатиты различного генеза, - первичный склерозирующий холангит, - муковисцидоз (кистозный фиброз), - неалкогольный стеатогепатит, - алкогольная болезнь печени, - дискинезия желчевыводящих путей.
Противопоказания - Рентгеноположительные (с высоким содержанием кальция) желчные камни;	Противопоказания - Рентгеноположительные (с высоким содержанием кальция) желчные камни;

Старая редакция	Новая редакция
- нарушение сократительной способности желчного пузыря и желчных протоков; - острые воспалительные заболевания желчного пузыря и желчных протоков; - окклюзия желчевыводящих путей (окклюзия общего желчного или пузырного протоков); - частые эпизоды желчной колики; - повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим желчным кислотам; - детский возраст до 3 лет (для твердых лекарственных форм); - цирроз печени в стадии декомпенсации; - выраженная печеночная и/или почечная недостаточность.	- нарушение сократительной способности желчного пузыря; - закупорка желчных путей (закупорка общего желчного протока или пузырного протока); - частые эпизоды желчной колики; - острые воспалительные заболевания желчного пузыря и желчных протоков; - цирроз печени в стадии декомпенсации; - выраженная печеночная и/или почечная недостаточность; - повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим желчным кислотам.
<u>Педиатрическая популяция</u> Неудачно выполненная портоэнтеростомия или случаи отсутствия восстановления нормального оттока желчи у детей с атрезией желчевыводящих путей. Детям в возрасте до 3 лет, а также пациентам с затруднениями при проглатывании твердых лекарственных форм, рекомендуется применять препараты урсодезоксихолевой кислоты в виде суспензии.	<u>Педиатрическая популяция</u> Неудачно выполненная портоэнтеростомия или случаи отсутствия восстановления нормального потока желчи у детей с атрезией желчевыводящих путей. Урсодезоксихолевая кислота не имеет возрастных ограничений в применении, но детям в возрасте до 3 лет рекомендуется применять препараты урсодезоксихолевой кислоты в виде суспензии, так как могут возникать затруднения при проглатывании капсул.

Представитель
организации-заявителя



Валеева Э.Р.