МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фамотидин-АКОС

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые плёночной оболочкой 20 мг и 40 мг

лекарственная форма, дозировка

Открытое Акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез"), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения "__" 19 12 11 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Каждая таблетка содержит: *Активное вещество:* фамотидина - 20 мг или 40 мг. *Вспомогательные вещества:* лактоза (сахар молочный), крахмал кукурузный, кальция стеарат (кальций стеариновокислый), тальк, гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), кросповидон (коллидон CL-M); *Оболочка:* гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), титана диоксид (титана двуокись), макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000, полиэтиленоксид 4000), пропиленгликоль, тальк.	**Состав:** Каждая таблетка содержит: *Активное вещество:* фамотидин - 20 мг, 40 мг. *Вспомогательные вещества:* *Состав ядра:* лактозы моногидрат (сахар молочный) - 73,2 мг, 146,4 мг, крахмал кукурузный - 37,56 мг, 75,12 мг, кальция стеарат (кальций стеариновокислый) - 1,4 мг, 2,8 мг, тальк - 2,8 мг, 5,6 мг, гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза) - 0,84 мг, 1,68 мг, кросповидон (коллидон CL-M) - 4,2 мг, 8,4 мг; *Состав оболочки:* гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза) - 2,74 мг, 5,48 мг, титана диоксид (титана двуокись) - 1,82 мг, 3,64 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000, полиэтиленоксид 4000) - 1,764 мг, 3,528 мг, пропиленгликоль - 0,54 мг, 1,08 мг, тальк - 0,136 мг, 0,272 мг.

Заместитель исполнительного директора ОАО "Синтез" В.И. Петухов