ЛП-002928-230819

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фамацивир®
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, 250 мг и 500 мг

АО «ФП «Оболенское», Российская Федерация

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____»23 08 19 20___ г.

Старая редакция	**Новая редакция**
Состав 1 таблетка содержит: *активное вещество:* фамцикловир 125 мг/ 250 мг/ 500 мг; *вспомогательные вещества:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 4,8 мг/ 9,6 мг/ 19,2 мг, лактоза безводная 20,0 мг/ 40,0 мг/ 80,0 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 2,7 мг/ 5,4 мг/ 10,8 мг, целлюлоза микрокристаллическая 16,7 мг/ 33,4 мг/ 66,8 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмала гликолят) 9,0 мг/ 18,0 мг/ 36,0 мг, магния стеарат 1,8 мг/ 3,6 мг/ 7,2 мг; *вспомогательные вещества для оболочки:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 3,5 мг/ 7,0 мг/ 14,0 мг, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) 1,0 мг/ 2,0 мг/ 4,0 мг, титана диоксид 0,5 мг/ 1,0 мг/ 2,0 мг.	**Состав** ***1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит:*** *действующее вещество:* фамцикловир 125 мг/250 мг/500 мг; *вспомогательные вещества:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), лактоза безводная, целлюлоза микрокристаллическая тип 101, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмала гликолят), кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат. *вспомогательные вещества для оболочки:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.
Описание Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклой формы (при дозировке 125 мг и 250 мг) или двояковыпуклые, про-	**Описание** Дозировка 125 мг и 250 мг: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Дозировка 500 мг: двояковыпуклые таблетки

117960

Старая редакция	Новая редакция
долговатой формы со скругленными концами, с риской (при дозировке 500 мг). На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета. **Условия хранения** В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	белого или почти белого цвета, продолговатой формы со скругленными концами, с риской. На поперечном разрезе ядро таблеток всех дозировок белого или почти белого цвета. **Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Директор по регистрации **Г.У. Сетдекова**

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
НЦЭСМП