


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Аллерфекс®

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, 120 мг и 180 мг
лекарственная форма, дозировка

НАО «Северная звезда», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 6

180821

Дата внесения Изменения « » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>активное вещество:</i> фексофенадина гидрохлорид – 30 мг, 120 мг и 180 мг. <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> целлюлоза микрокристаллическая – 23,0 мг, 92,0 мг, 138,0 мг, кальция дигидрофосфат – 5,0 мг, 20,0 мг, 30,0 мг, крахмал картофельный – 7,5 мг, 30,0 мг, 45,0 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 4,0 мг, 16,0 мг, 24,0 мг, магния стеарат – 0,75 мг, 3,0 мг, 4,5 мг, тальк – 0,75 мг, 3,0 мг, 4,5 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 1,5 мг, 6,0 мг, 9,0 мг, повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский) – 2,5 мг, 10,0 мг, 15,0 мг. <i>вспомогательные вещества (оболочка):</i> Опадрай II (спирт поливиниловый, частично гидролизованный – 0,88 мг, 3,96 мг, 6,16 мг, тальк – 0,4 мг, 1,8 мг, 2,8 мг, титана диоксид Е 171 – 0,3834 мг, 1,7253 мг, 2,6838 мг, макрогол (полиэтиленгликоль 3350) – 0,247 мг, 1,1115 мг, 1,729 мг, лецитин (соевый) Е 322 – 0,07 мг, 0,315 мг, 0,49 мг, алюминиевый лак на основе азорубина – 0,0102 мг, 0,0459 мг, 0,0714 мг, алюминиевый лак на основе красителя пунцового [Понсо 4R] – 0,0082 мг, 0,0369 мг, 0,0574 мг, алюминиевый лак на основе красителя индигокармина – 0,0012 мг, 0,0054 мг, 0,0084 мг).	Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество:</i> фексофенадина гидрохлорид – 30 мг, 120 мг и 180 мг; <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> целлюлоза микрокристаллическая 102 – 21,5 мг, 86,0 мг, 129,0 мг, кальция гидрофосфата дигидрат – 5,0 мг, 20,0 мг, 30,0 мг, крахмал картофельный – 7,5 мг, 30,0 мг, 45,0 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 4,0 мг, 16,0 мг, 24,0 мг, магния стеарат – 0,75 мг, 3,0 мг, 4,5 мг, тальк – 0,75 мг, 3,0 мг, 4,5 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 1,5 мг, 6,0 мг, 9,0 мг, повидон К 30 (поливинилпирролидон среднемолекулярный) – 4,0 мг, 16,0 мг, 24,0 мг. <i>вспомогательные вещества (оболочка):</i> гипромеллоза – 1,0 мг, 4,5 мг, 7,0 мг, полисорбат-80 (твин-80) – 0,4 мг, 1,8 мг, 2,8 мг, тальк – 0,4 мг, 1,8 мг, 2,8 мг, титана диоксид Е 171 – 0,184 мг, 0,828 мг, 1,288 мг, алюминиевый лак на основе красителя азорубин Е 122 – 0,016 мг, 0,072 мг, 0,112 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Описание Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от розового до темно-розового цвета, круглые, двояковыпуклой формы. Таблетки на изломе белого или почти белого цвета. Форма выпуска Таблетки покрытые оболочкой 30 мг, 120 мг и 180 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 30 таблеток в банку полимерную или во флакон полимерный. Каждую банку или флакон, 1, 2, 3 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	Описание Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от розового до темно-розового цвета, круглые, двояковыпуклые. На поперечном разрезе ядра таблеток белого или почти белого цвета. Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, 120 мг и 180 мг. По 10 таблеток в упаковки ячейковые контурные из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или фольги алюминиевой с термосвариваемым покрытием или фольги алюминиевой импортной. По 30 таблеток в банки полимерные типа БП из полиэтилена низкого давления с крышками из полиэтилена высокого давления или во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления с крышками из полиэтилена высокого давления или импортные флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления с крышками из полиэтилена высокого давления. Свободное пространство в банках и флаконах заполняют ватой медицинской гигроскопической. Каждую банку, флакон, 1, 2, 3 упаковки ячейковые контурные вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную из картона для потребительской тары или импортного, разрешенного к применению МЗ РФ.
Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.	Срок годности 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Генеральный директор
НАО «Северная звезда»



Е.В. Чуглина