МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 002726-090418
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарат

Фексофенадин-Акрихин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг и 180 мг

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения изменения «____» 090418 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Частота развития побочных эффектов классифицирована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (≥ 10 %); часто (≥ 1 %, < 10 %); нечасто (≥ 0,1 %, < 1 %); редко (≥ 0,01 %, < 0,1 %); очень редко (< 0,01 %), включая единичные случаи. *Со стороны нервной системы:* часто – головная боль, сонливость, головокружение. *Со стороны желудочно-кишечного тракта:* часто – тошнота. *Со стороны кожи и подкожных тканей:* редко – экзантема.	**Побочное действие** Частота развития побочных эффектов классифицирована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (≥ 10 %); часто (≥ 1 %, < 10 %); нечасто (≥ 0,1 %, < 1 %); редко (≥ 0,01 %, < 0,1 %); очень редко (< 0,01 %), включая единичные случаи. *Со стороны нервной системы:* часто – головная боль, сонливость, головокружение. *Со стороны желудочно-кишечного тракта:* часто – тошнота. *Со стороны кожи и подкожных тканей:*

Прочие: часто – усталость; нечасто – слабость. ***Постмаркетинговые исследования (частота неизвестна)*** *Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности (отек Квинке, затруднение дыхания, одышка, гиперемия кожных покровов, системные анафилактические реакции). *Со стороны нервной системы и психики:* бессонница, нервозность, нарушение сна, кошмарные сновидения. *Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, ощущение сердцебиения. *Со стороны желудочно-кишечного тракта:* диарея. *Со стороны кожи и подкожных тканей:* сыпь, крапивница, зуд. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.	редко – экзантема. *Прочие:* часто – усталость; нечасто – слабость. ***Постмаркетинговые исследования (частота неизвестна)*** *Со стороны иммунной системы:* Реакции гиперчувствительности: ангионевротическй отек, затруднение дыхания, одышка, гиперемия. кожных покровов, системные анафилактические реакции. *Со стороны нервной системы и психики:* бессонница, нервозность, нарушение сна, необычные сновидения. *Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, ощущение сердцебиения, нерегулярное сердцебиение. *Со стороны желудочно-кишечного тракта:* диарея. *Со стороны кожи и подкожных тканей:* сыпь, крапивница, зуд. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Представитель фирмы

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» Акрихин ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 9 ОГРН 1025003815170 ИНН 5031013320 Старая Купавна Московская область

Е.В. Каткова