

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Клей БФ-6

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование

Клей БФ-6

Международное непатентованное или группировочное наименование

Фенолформальдегидная смола

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 г.

Действующее вещество: фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый) – 1,65 г.

Вспомогательные вещества: поливинилбутирал (поливинилбутираль) – 9,7 г,
дибутилфталат – 3,5 г, клещевины обыкновенной семян масло жирное (касторовое масло)
– 1,75 г, канифоль – 0,85 г, этанол (спирт этиловый) 95 % – 82,55 г.

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; фенол и его производные.

Код АТХ: D08AE

Фармакологические свойства

Оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей плёнки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.

Показания к применению

Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к фенолформальдегидной смоле или к любому из вспомогательных веществ, детский возраст до одного года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

На основании существующих данных, применение в терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на развивающийся плод.

Перед применением препарата, если вы беременны, или предполагаете, что вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможно применение в период грудного вскармливания. Перед применением в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнений. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и подсушивают место, подлежащее покрытию клеем. Препарат наносят тонким, равномерным слоем непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку. Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При указанном способе применения практически невозможна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения.

Избегать попадания на слизистые оболочки глаз.

Не отмечено влияния применения препарата на течение хронических заболеваний.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 5, 10, 15, 25, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми из полиэтилена высокого давления и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

По 5, 10, 15, 25, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полимерными из полиэтилена высокого давления с уплотнительными элементами.

По 5, 10, 15, 25, 40 г в тубы алюминиевые, с колпачками из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления.

По 5, 10, 30 г во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления.

На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон, флакон-капельницу или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, вдали от источника огня и отопительной системы.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО «Формула-ФР»

Россия, 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 139, офис 10

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.