

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Клей БФ-6

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Клей БФ-6

Международное непатентованное или группировочное наименование:
фенолформальдегидная смола

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав:

100 г препарата содержат:

Действующее вещество:

фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый в пересчете на сухое вещество) – 1,65 г.

Вспомогательные вещества:

поливинилбутирал (поливинилбутираль) – 9,7 г, канифоль – 0,85 г, дибутилфталат – 3,5 г, клещевины обыкновенной семян масло жирное (касторовое масло) – 1,75 г, этанол (спирт этиловый) 95 % - 82,55 г.

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло - желтого до красноватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; фенол и его производные.

Код АТХ: D08AE

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей плёнки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

На основании существующих данных, применение в терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на развивающийся плод.

Перед применением препарата, если вы беременны, или предполагаете, что вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможно применение в период грудного вскармливания. Перед применением в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно.

Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнения. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое необходимо покрыть клеем. Препарат наносят непосредственно на поврежденную поверхность тонким слоем, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки сверху на нее наносят новую пленку.

Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже на протяжении 2-3 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения.

Избегать попадания на слизистые оболочки глаз.

Не отмечено влияние применения препарата на течение хронических заболеваний.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 10 г или 15 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, вдали от источников нагрева и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии потребителя

Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод" (АО «МПЗ»), Россия
602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а,
факс (49234) 6-02-52, тел.6-34-71