

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФОРМИДРОН

Регистрационный номер:

Торговое наименование Формидрон

Международное непатентованное или группировочное наименование Формальдегид

Лекарственная форма Раствор для наружного применения [спиртовой]

Состав

Действующее вещество:

Формальдегида раствор (формалин) - 10,0 г

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый (этанол) 95 % - 39,5 г

Вода очищенная - 50,0 г

Одеколон - 0,5 г

Описание Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и дезодорирующее действие.

Показания к применению

Повышенное потоотделение.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к формальдегиду и другим компонентам препарата, воспалительные заболевания кожи, детский возраст до 16 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Нет данных.

Способ применения и дозы

Наружно. Рекомендуется протирать межпальцевые складки ног небольшим количеством препарата 1 раз в день. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания препарат наносят на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить на срок не более

20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин препарат можно наносить не ранее, чем через сутки. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд.

Побочное действие

Аллергические реакции, местные реакции в виде покраснения кожи и зуда. При длительном использовании – сухость кожи. В этом случае применение препарата прекращают.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки при применении препарата не поступало.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения [спиртовой] 3,7 %.

50 мл, 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными, навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

50 мл, 100 мл во флаконы темного стекла в комплекте с полимерной насадкой-распылителем и колпачком.

Флаконы по 50 мл или 100 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку из картона.

1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

1 флакон помещают в пачку из картона, на которую нанесен полный текст инструкции по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Производитель/ Владелец регистрационного удостоверения/ Организация,
принимая претензии от потребителей**

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2

Тел./факс (4822) 44-41-19